

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКА  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ


Отдел программ хирургических специальностей

РАССМОТРЕНО

На заседании отдела протокол № 12

от « 18 » 11 2022-года

Рук.отд. Белеков Ж.О.



ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Для итогового контроля по специальности


«Офтальмология»

На 2022-2023 учебный год

2-курс 3-семестр

Наименование дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия 10% ( 96 ч)		Практика 90%
		Лекция	Семинарские	
ОКД	864	36	66	792
СД	240	10	10	220
Аттестация	48	2	2	44

Составители:

1.ФИО Мамадашова Г. подпись / 

2.ФИО Аскаров Г.У подпись / 

Эксперт –тестолог: ФИО Шметова Ж.Б подпись / 

<b>№</b>	<b>Название дисциплины</b>	<b>Количество тестовых задач</b>	<b>% ное соотношение</b>
1 ОКД	Топографическая анатомия и оперативная хирургия	54	21%
2 ОКД	Оториноларингология	33	13 %
3 ОКД	Онкология	44	18 %
4 ОКД	Клиническая фармакология	44	18%
5 ОКД	Неврология	21	9%
6 СД	Анатомия и физиология органов зрения, функциональные и клинические методы исследования	54	21%
<b>Итого:</b>		<b>250</b>	<b>100%</b>

## Тесты по офтальмологии для ординаторов 2-года.

1.У больного в проходящем свете рефлекс с глазного дна слабо- розовый. При боковом освещении хрусталик приобретает отчетливо серый оттенок. Острота зрения 0,03-0,04 не корrigирует. Больному следует поставить диагноз?

- 1) начальная катаракта
- 2) незрелая катаракта
- 3) зрелая катаракта
- 4) перезрелая катаракта

2.В клинику обратился больной с жалобами на покраснение, выраженную светобоязнь и слезотечение на левом глазу. Объективно: в склере несколько очагов краснофиолетового цвета, возвышающиеся над склерой, болезненные при пальпации. В процесс вовлечена роговица. Больной страдает ревматизмом и отмечает, что подобное состояние бывает часто на протяжении последних лет. Поставьте диагноз?

- 1) кератоирисцилит
- 2) кератосклерит
- 3) эктазия склеры
- 4) эписклерит

3.Больному 20-ти лет произведена керотопластика на правом глазу.В детстве перенес ожог глаза известью. После операции: V0Д=0.02-3.0Д=0.06. Поставьте предварительный диагноз?

1. истерическая амблиопия
2. обскурационная амблиопия
3. дисбинокулярная амблиопия
4. анизометропическая амблиопия

4.В клинику обратился больной с жалобами на слезотечение, гнойное отделяемое, отек век, правой половины лица, головную боль, общее недомогание, повышение температуры. Объективно: резкий отек век, глазная щель закрыта, отек распространяется на правую половину щеки, у внутреннего угла глаза пальпируется плотный инфильтрат. Поставьте предварительный диагноз?

1. острый эпидемический конъюктивит
2. абсцедирующий ячмень нижнего века
3. дакриоаденит
4. флегмона слезного мешка

5. Мужчина 45 лет обратился с жалобами на упорное слезотечение правого глаза. Два года назад попал в автокатастрофу. Объективно: справа рубцовый выворот нижнего века, искривление носовой перегородки, при промывании слезных путей жидкость выходит через верхнюю слезную точку. Причина этого?

1. выворот слезной точки
2. хронический дакриоцистит
3. выворот нижнего века
4. флегмона слезного мешка

6.Больной был расстроен, ночью не спал. Утром появились сильные боли в правой половине головы и глаза, туман перед глазами, радужные круги. Объективно: застойная инъекция, роговица отечная, передняя камера мелкая, зрачок расширен. Пальпаторно вгд повышен. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) острый иридоциклит
- 2) острый кератит
- 3) острый приступ глаукомы
- 4) набухающая катаракта

7. Больной 60 лет жалуется на понижение зрения в течение полугода. При осмотре: глаза спокойные, небольшое слезотечение. ВГД пальпаторно нормальное, роговица не изменена, передняя камера средней глубины. Реакция зрачка на свет живая, просвет зрачка "серого цвета". Рефлекса с глазного дна нет. Острота зрения - счет пальцев у лица. При промывании слезных путей - жидкость проходит в нос с трудом. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) хронический дакриоцистит
- 2) хронический блефарит
- 3) старческая катаракта, дакриostenоз
- 4) первичная закрытоугольная глаукома

8. Больной обратился с жалобами на понижение зрения в левом глазу, тупые боли, покраснение глаза. В анамнезе туберкулез легких. При осмотре: умеренная перикорнеальная инъекция, сальные преципитаты на задней поверхности роговицы, грубые задние синехии, помутнение стекловидного тела. Поставьте диагноз?

- 1) закрытоугольная глаукома
- 2) заднийuveit
- 3) панувеит
- 4) переднийuveit

9. Больной на протяжении нескольких часов в ветреную погоду выполнял электросварочные работы. Вечером у него появились светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, гиперемия конъюнктивы обоих глаз. Вероятным заболеванием может быть?

- 1) бактериальный конъюнктивит
- 2) внутренний ячмень века
- 3) аллергический конъюнктивит
- 4) электрофтальмия

10. В клинику обратился больной с жалобами на плавающие мушки перед одним глазом. В анамнезе контузия глазного яблока. При обследовании в проходящем свете: плавающие хлопьевидные помутнения. Поставьте диагноз?

- 1) нитчатая деструкция стекловидного тела
- 2) зернистая деструкция стекловидного тела
- 3) полный гемофтальм
- 4) частичный гемофтальм

11. Больной получил травму глаза. При осмотре: глаз раздражен, передняя камера глубокая, в области зрачка определяется грыжа стекловидного тела. Приставление к глазу линзы +10,0 Д улучшает зрение. Поставьте диагноз?

- 1) проникающее ранение склеры
- 2) подвывих хрусталика
- 3) проникающее ранение роговицы
- 4) вывих хрусталика в стекловидное тело

12. Мужчина 45 лет обратился с жалобами на упорное слезотечение правого глаза. Два года назад попал в автокатастрофу. Объективно: справа рубцовый выворот нижнего века, искривление носовой перегородки, при промывании слезных путей жидкость выходит через верхнюю слезную точку. Укажите причину этого?

1. выворот слезной точки
2. хронический дакриоцистит
3. выворот нижнего века
4. флегмона слезного мешка
5. структура слезных канальцев

13. Больной получил тупую травму глаза. Обратился с жалобами на снижение зрения. При осмотре выявлено: передний отрезок без особенностей, острота зрения 0,02. Офтальмоскопия глазного дна

выявила вуалеподобную пленку серого цвета, которая колышится при движениях глаза. Поле зрения сужено в нижне-внутреннем квадранте. Диагноз, дополнительные симптомы?

- 1) частичный гемофтальм
- 2) отслойка цилиарного тела
- 3) разрыв сетчатки
- 4) травматическая катаракта

14. В клинику обратился больной жалобами на отсутствие предметного зрения на одном глазу. В анамнезе контузия глазного яблока. При исследовании методом диафаноскопии, рефлекс отсутствует. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) травматическая катаракта
- 2) отслойка сетчатки
- 3) частичный гемофтальм
- 4) полный гемофтальм

15. Больной 40 лет. Жалуется на периодическую тяжесть в глазу, головные боли, затуманивание зрения, особенно при наклоне головы. Объективно: глаз спокоен, роговица прозрачная, передняя камера мельче средней. Глазное дно: на диске зрительного нерва отмечается сдвиг сосудистого пучка в носовую сторону. Функции не изменены. Поставьте диагноз?

- 1) начальная закрытоугольная глаукома
- 2) начинающаяся катаракта
- 3) невралгия тройничного нерва
- 4) гипертоническая нейроретинопатия
- 5) ретробульбарный неврит

16. Больной обратился с жалобами на боли в глазу, летающие мушки перед глазом, снижение зрения. Объективно: перикорнеальная инъекция, на задней поверхности роговицы имеются отложения серого цвета, зрачок неправильной формы, при исследовании методом проходящего света в стекловидном теле видны плавающие помутнения. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) закрытоугольная глаукома
- 2) увеит
- 3) катаракта
- 4) кератит

17. Больной почувствовал боли в правом глазу, снижение зрения, глаз покраснел, изменился в цвете. При осмотре: смешанная инъекция глазного яблока, радужная оболочка зеленоватого цвета, зрачок узкий, при пальпации отмечается резкая болезненность. С глазного дна розовый рефлекс. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) гемофтальм
- 2) сидероз
- 3) острый приступ глаукомы
- 4) иридоциклит

18. Больной заметил беспорядочные плавающие мушки перед левым глазом, резкое ухудшение остроты зрения. Объективно: глаз спокоен, передний отрезок глаза не изменен. При офтальмоскопии в макулярной области виден очаг желто-серого цвета с нечеткими границами, размером в полтора диаметра диска зрительного нерва. Поставьте диагноз?

- 1) дегенерация сетчатки
- 2) деструкция стекловидного тела
- 3) центральный хориоретинит
- 4) иридоциклит

19. Девочка 15 лет перенесла гнойный гидраденит в правой подмышечной впадине. Через 2 дня появились боли в правом глазу, резко ухудшилось зрение, повысилась температура тела. Объективно: экзофтальм, хемоз конъюнктивы, ограничение движений глазного яблока. Роговица прозрачная, при исследовании в проходящем свете виден желтого цвета экссудат. Поставьте диагноз?

- 1) гнойный иридоциклит
- 2) метастатическая офтальмия
- 3) острый приступ глаукомы
- 4) ретробульбарный неврит

20. В клинику обратился молодой человек 27 лет с жалобами на боли в глазу, снижение зрения. Объективно: острота зрения 0,1. Глаз раздражен, передняя камера мелкая, зрачок неправильной формы, подтянут к лимбу на 3 часах. В этом месте видно темное округлое образование. Болен в течении 12 часов. Ваш предполагаемый диагноз?

- 1) меланома радужки
- 2) пигментное пятно радужки
- 3) проникающее ранение лимба
- 4) новообразование лимба

21. У больного на протяжении 1 года был правосторонний хронический дакриоцистит. Два дня назад во время уборки квартиры в правый глаз попала соринка. За помощью никуда не обращался. Самостоятельно закапывал какие-то глазные капли, улучшения не наступило. При осмотре: острота зрения 0,1. Глаз раздражен. На роговице в центре видно серое образование. На дне передней камеры горизонтальный уровень желтоватой жидкости. Ваш предполагаемый диагноз?

- 1) травматический кератит
- 2) иридоциклит
- 3) язва роговицы
- 4) катаракта

22. После перенесенной вирусной инфекции у больного появилось постепенное снижение зрения. При обследовании: диск зрительного нерва гиперемирован, границы стушеваны, увеличен размер слепого пятна. Поставьте диагноз?

- 1) ретробульбарный неврит
- 2) неврит зрительного нерва
- 3) застойный сосок
- 4) папилит

23.Нерв, иннервирующий мышцу, поднимающую верхнее веко (m. levator palpebrae superior)?

- 1)N. Facialis.
- 2)N. Nasociliaris.
- 3)N. Opticus.
- 4)N. Oculomotorius.

24.Порция круговой мышцы века, участвующая в смыкании глазной щели при мигании?

- 1)Пальпебральная
- 2)Орбитальная
- 3)Слезная
- 4)Конъюнктивальная

25.Нерв, иннервирующий круговую мышцу глаза (m. orbicularis oculi)?

- 1)N. Facialis.
- 2)N. Nasociliaris.
- 3)N. Opticus.
- 4)N. Oculomotorius.

26.Лимфатические сосуды верхнего века впадают в лимфатические узлы?

- 1)Предушные
- 2)Подчелюстные
- 3)Затылочные
- 4)Шейные

28.Лимфатические сосуды нижнего века впадают в лимфатические узлы?

- 1)Предушные
- 2)Подчелюстные
- 3)Затылочные
- 4)Шейные

29. Чувствительная иннервация роговицы осуществляется?

- 1)N. Facialis.
- 2)N. Nasociliaris.
- 3)N. Ophthalmicus.
- 4)N. Oculomotorius.

30. Двигательная иннервацию век осуществляется:?

- 1)N. Facialis.
- 2)N. Nasociliaris.
- 3)N. Ophthalmicus.
- 4)N. Oculomotorius.

31. Нерв, не участвующий в чувствительной иннервации конъюнктивы:?

- 1)N. Maxillaris.
- 2)N. Nasociliaris.
- 3)N. Lacrimalis.
- 4)N. Frontalis.

32. Метод исследования конъюнктивы?

- 1)Диафанскопия. \*2. Боковое (фокальное) освещение
- 2)Тонометрия
- 3)В проходящем свете
- 4)Биомикроскопия

33 В клинику обратился молодой человек 27 лет с жалобами на боли в глазу, снижение зрения. Объективно: острота зрения 0,1. Глаз раздражен, передняя камера мелкая, зрачок неправильной формы, подтянут к лимбу на 3 часах. В этом месте видно темное округлое образование. Болен в течении 12 часов. Ваш предполагаемый диагноз?

- 1) меланома радужки
- 2) пигментное пятно радужки
- 3) проникающее ранение лимба
- 4) новообразование лимба

34 У больного на протяжении 1 года был правосторонний хронический дакриоцистит. Два дня назад во время уборки квартиры в правый глаз попала соринка. За помощью никуда не обращался. Самостоятельно закапывал какие-то глазные капли, улучшения не наступило. При осмотре: острота зрения 0,1. Глаз раздражен. На роговице в центре видно серое образование. На дне передней камеры горизонтальный уровень желтоватой жидкости. Ваш предполагаемый диагноз?

- 1) травматический кератит
- 2) иридоциклит
- 3) язва роговицы
- 4) катаракта

36 После перенесенной вирусной инфекции у больного появилось постепенное снижение зрения. При обследовании: диск зрительного нерва гиперемирован, границы стушеваны, увеличен размер слепого пятна. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) ретробульбарный неврит
- 2) неврит зрительного нерва
- 3) застойный сосок
- 4) папилит

36.Большинство глазных мышц начинается от?

- 1)Сухожильного кольца Цинна
- 2)Foramen rotundum
- 3)Верхней глазничной щели
- 4)Нижней глазничной щели

37.Иннервирует все экстравекулярные мышцы, кроме?

- 1)Внутренней прямой
- 2)Верхней косой
- 3)Нижней прямой
- 4)Нижней косой

38.Мышцы глазного яблока, не являющиеся антагонистами?

- 1)Верхняя косая и нижняя косая
- 2)Наружная прямая и внутренняя прямая
- 3)Верхняя прямая и нижняя прямая
- 4)Верхняя косая и нижняя прямая

39.Мышцы глазного яблока, являющиеся синергистами?

- 1)Нижняя косая и наружная прямая
- 2)Наружная прямая и внутренняя прямая
- 3)Верхняя прямая и наружная прямая
- 4)Нижняя прямая и наружная прямая

40.Глазная мышца, начинающаяся не от сухожильного кольца Цинна?

- 1)Наружная прямая
- 2)Внутренняя прямая
- 3)Верхняя прямая
- 4) Нижняя косая

41.Клеточные элементы сетчатки, не являющиеся нейронами?

- 1)Фоторецепторы
- 2)Глиальные клетки Мюллера
- 3)Биполярные клетки
- 4)Ганглиозные клетки

42.Анатомическое образование, не участвующее в формировании угла передней камеры?

- 1)Трабекулярная сеточка
- 2)Радужная оболочка
- 3)Цилиарное тело
- 4)Циннова связка

43.Глазодвигательная мышца, отводящая глаз?

- 1)Наружная прямая
- 2)Нижняя прямая
- 3)Верхняя прямая
- 4)Внутренняя прямая

44.Глазодвигательная мышца, приводящая глаз?

- 1)Наружная прямая
- 2)Верхняя косая
- 3)Нижняя косая
- 4)Внутренняя прямая

45.Глазодвигательная мышца, поднимающая глаз?

- 1)Наружная прямая
- 2)Нижняя косая

- 3) Внутренняя прямая  
4) Внутренняя прямая

46. Глазодвигательная мышца, опускающая глаз?

- 1) Наружная прямая  
2) Нижняя прямая  
3) Верхняя прямая  
4) Внутренняя прямая

47. Функции верхней косой мышцы?

- 1) Опускание, отведение  
2) Поднимание, отведение  
3) Поднимание, приведение  
4) Опускание, приведение

48. Функции верхней прямой мышцы?

- 1) Опускание, отведение  
2) Поднимание, отведение  
3) Поднимание, приведение  
4) Опускание, приведение

49 У ребенка в возрасте 3 лет появились жалобы на отклонение правого глаза кнутри. Объективно: глаза спокойные, правый глаз отклонен кнутри. ВГД пальпаторно нормальное. Размер глазного яблока соответствует возрасту, цвет зрачка серый. Рефлекса с глазного дна нет. Поставьте диагноз?

- 1) врожденная катаракта  
2) врожденная глаукома  
3) ретинобластома  
4) бельмо

50. Иннервация сфинктера зрачка осуществляется?

- 1) N. Oculomotorius  
2) N. Trigeminus  
3) N. Nasociliaris  
4) Нервыми волокнами truncus sympatheticus

51. Иннервация дилататора зрачка осуществляется?

- 1) N. Oculomotorius  
2) N. Trigeminus  
3) N. Nasociliaris  
4) Нервыми волокнами truncus sympatheticus

51. Пациент обратился с клиникой острого приступа глаукомы. При этом определяется набухающая катаракта того же глаза. Тактика врача?

- 1) проведение консервативного лечения амбулаторно  
2) проведение консервативного лечения в условиях стационара  
3) направление в стационар для оперативного лечения по поводу острого приступа глаукомы  
4) срочное направление в стационар для экстракции катаракты

52. У больного в проходящем свете рефлекс с глазного дна слабо розовый. При боковом освещении хрусталик приобретает отчетливо серый оттенок. Острота зрения 0,03-0,04, не корректирует.

Больному следует поставить диагноз?

- 1) начальной катаракты  
2) незрелой катаракты  
3) зрелой катаракты  
4) перезрелой катаракты

53. Больной 40 лет. Жалуется на периодическую тяжесть в глазу, головные боли, затуманивание зрения, особенно при наклоне головы. Объективно: глаз спокоен, роговица прозрачная, передняя камера мельче средней. Глазное дно: на диске зрительного нерва отмечается сдвиг сосудистого пучка в носовую сторону. Функции не изменены. Поставьте диагноз?

- 1) начальная закрытоугольная глаукома
- 2) начинающаяся катаракта
- 3) невралгия тройничного нерва
- 4) гипертоническая нейроретинопатия
- 5) ретробульбарный неврит

54. У больного прогрессирующее одностороннее концентрическое сужение поля зрения.  
Необходимо исключить?

- 1) опухоль головного мозга
- 2) тапеторетинальную дистрофию сетчатки
- 3) открытуюгольную глаукому
- 4) неврит зрительного нерва

55 У больного двухстороннее трубочное поле зрения. Какие заболевания необходимо исключить?

- 1) менингит
- 2) глаукому
- 3) неврастению
- 4) атеросклероз мозговых сосудов

56. Причиной отслойки сетчатки не может быть?

- 1) Кистовидная дегенерация сетчатки
- 2) Посттравматический разрыв сетчатки
- 3) Неврит зрительного нерва
- 4) Витреоретинальная пролиферация

57. Через верхнюю глазничную щель проходят?

- |                         |                 |  |   |
|-------------------------|-----------------|--|---|
| 1) N. Oculomotorius, n. | Trochlearis, n. | Abducens,  | v. Ophtalmica superior, ветви n. Trigemini. |
| 2) N. Oculomotorius, n. | Trochlearis, n. | Abducens,  | v. Ophtalmica superior.                     |
| 3) N. Oculomotorius, n. | Trochlearis, n. | Abducens,  | v. Ophtalmica superior, n. Opticus.         |
| 4) N. Oculomotorius, n. | Trochlearis, n. | Abducens, v. Ophtalmica superior, ветви n. Trigemini, n. Opticus |   |

58. Черепно-мозговой нерв, не участвующий в иннервации экстакулярных мышц?

- 1) N. Oculomotorius
- 2) N. Trochlearis
- 3) N. Opticus
- 4) N. Abducens

59. Способность заметить объект обозначается как?

- 1) Minimum separabile
- 2) Minimum visible
- 3) Minimum cognoscibile
- 4) Minimum deformabile

60. Способность различить детали замеченного объекта обозначается как?

- 1) Minimum separabile
- 2) Minimum visible
- 3) Minimum cognoscibile

4)Minimum deformabile

61.Максимальная величина зрительного угла в норме?

- 1)1 градус
- 2)1 угловая секунда
- 3)1 угловая минута
- 4)1 диоптрия

62.Аппарат Рота используют для?

- 1)Исследования цветового зрения
- 2)Исследования бинокулярного зрения
- 3)Освещения визометрических таблиц
- 4)Измерения внутриглазного давления

63.Метода, с помощью которого нельзя измерить остроту зрения ниже 0,1?

- 1)Приближение пациента к таблице Рабкина
- 2)Использование оптотипов Поляка
- 3)Счет пациентом пальцев врача
- 4)Приближение пациента к таблице Головина-Сивцева

64.Таблицы Рабкина являются?

- 1)Полихроматическими
- 2)Пороговыми
- 3)Контрольными

65.Отдаленным последствием окклюзии центральной вены сетчатки может быть?

- 1)Субатрофия глазного яблока
- 2)Вторичная глаукома
- 3)Отслойка сетчатки
- 4)Офтальмоплегия

66.Офтальмоскопический симптом острого нарушения кровообращения в центральной вене сетчатки?

- 1)«Вишневой косточки»
- 2)«Раздавленного помидора»
- 3)«Медной проволоки»
- 4)«Серебряной проволоки»

67.При системной артериальной гипотензии артерии сетчатки?

- 1)Расширены
- 2)Сужены
- 3)Запустевшие
- 4)Не изменены

68.Сужение вены под артерией сетчатки называется?

- 1)Симптом артериовенозного перекреста 1 степени
- 2)Симптом артериовенозного перекреста 2 степени
- 3)Симптом артериовенозного перекреста 3 степени
- 4) Симптом артериовенозного перекреста 4 степени

69.Причиной неоваскуляризации сетчатки при сахарном диабете является?

- 1)Отслойка стекловидного тела
- 2)Гиалиноз сосудов
- 3)Тканевая гипоксия
- 4)Отслойка сетчатки

70.Процесс атрофии ткани внешне проявляется?

- 1)Уменьшением ее объема и снижением жизнедеятельности
- 2)Выраженной неоваскуляризацией
- 3)Патологической гиперпигментацией
- 4)Повышением функциональных возможностей

71.При первичной атрофии зрительного нерва границы его диска?

- 1)Становятся размытыми
- 2)Остаются четкими
- 3)Приобретают фестончатый вид
- 4)Имеют полигональные очертания

72.При вторичной атрофии зрительного нерва границы его диска?

- 1)Остаются размытыми
- 2)Приобретают фестончатый вид
- 3)Имеют полигональные очертания
- 4)Становятся четкими

73.Основными причинами разрывов сетчатки являются?

- 1)Дистрофия сетчатки. фиброз стекловидного тела
- 2)Офтальмогипертензия
- 3)Внутриглазные опухоли
- 4)Парез, паралич аккомодации

74.Офтальмоскопически разрыв сетчатки виден как участок с четкими контурами?

- 1)Белого цвета
- 2)Ярко-красного цвета
- 3)Серого цвета
- 4)Бесцветный

75.Отслойка сетчатки происходит на уровне?

- 1)Наружного плексиформного слоя
- 2)Между фоторецепторами и пигментным эпителием
- 3)Внутреннего плексифирмного слоя
- 4)Между пигментным эпителием и стекловидной пластинкой сосудистой

76.Достоверную информацию о площади отслойки сетчатки дает исследование?

- 1)Поля зрения
- 2)Цветоощущения
- 3)Остроты зрения
- 4)Темновой адаптации

77.Главным условием для возникновения отслойки сетчатки является наличие?

- 1)Разрыва сетчатки
- 2)Отека сетчатки
- 3)Помутнения стекловидного тела
- 4)Субретинального кровоизлияния

78.Разрывы сетчатки по их форме делятся на?

- 1)Эллипсовидный, прямоугольный
- 2)Клапанный, дырчатый, отрыв от зубчатой линии
- 3)Трапециевидный, круглый, овальный
- 4)Клиновидный, звездчатый.

79.Острота зрения глаза резко понижается, если отслойка сетчатки локализуется?

- 1)На периферии глазного дна
- 2)В паракентральной зоне
- 3)В области экватора глаза
- 4)Захватывает область желтого пятна

80. Устранение отслойки сетчатки возможно?

- 1)Медикаментозными средствами
- 2)Физиотерапевтическими методами
- 3)Хирургическим путем и с помощью лазера
- 4)Иногда самопроизвольным прилеганием

81. При сахарном диабете главной причиной отслойки сетчатки является?

- 1)Появление в сетчатке микроаневризм
- 2)Витреоретинальная пролиферация
- 3)Отек сетчатки
- 4)Трофические нарушения в сосудистой оболочке

82. Главной задачей операции по поводу отслойки сетчатки является?

- 1)Удаление субретинальной жидкости
- 2)Блокада разрыва сетчатки
- 3)Криокоагуляция склеры в области разрыва
- 4)Замена измененного стекловидного тела

83. Характерным признаком пигментной абиотрофии сетчатки на глазном дне являются?

- 1)Обширные белого цвета атрофические хориоретинальные очаги
- 2)Множественные красного цвета микроаневризмы
- 3)Множественные очажки пигмента по типу "костных телец"
- 4)Ишемический отек сетчатки

84. При периферической пигментной абиотрофии сетчатки характерна жалоба больных на?

- 1)Понижение остроты зрения
- 2)Расстройство цветоощущения
- 3)Ухудшение зрения в сумерках
- 4)Искажение величины и формы предметов

85. Лечение пигментной абиотрофии сетчатки?

- 1)Может привести к полному выздоровлению
- 2)Обеспечивает длительную стабилизацию процесса
- 3)Малоэффективно
- 4)Нецелесообразно

86. При макулодистрофии нарушение зрительных функций проявляется?

- 1)Сужением поля зрения
- 2)Понижением остроты зрения
- 3)Расстройством темновой адаптации
- 4)Нарушением аккомодации

87. При лучевой катаракте начальное помутнение формируется?

- 1)В ядре хрусталика
- 2)Под передней капсулой
- 3)Вдоль экватора
- 4)Под задней капсулой

88. При монокулярной афакии восстановление бинокулярного зрения невозможно с помощью?

- 1)Интраокулярной коррекции

- 2)Очковой коррекции
- 3)Контактной коррекции
- 4)Призматической коррекции

89.Бинокулярное зрение невозможно при полной коррекции монокулярной афакии обычными очками из-за?

- 1)Выраженных сферических aberrаций
- 2)Высокой анизэйконии
- 3)Выраженных хроматических aberrаций
- 4)Усиления явлений дифракции

90.Средством, замедляющим развитие катаракты, не является?

- 1)Сенкаталин
- 2)Солкосерил
- 3)Витайодурол
- 4)Квинакс

91.Согласно классификации не бывает катаракты?

- 1)Лучевой
- 2)Воспалительной
- 3)Травматической
- 4)Приобретенной

92.Рефракция глаза в процессе развития катаракты?

- 1)Усиливается
- 2)Ослабевает
- 3)Становится астигматической
- 4)Не изменяется

93. В покое аккомодации преломляющая сила хрусталика составляет?

- 1) 5-12 дптр
- 2) 12-18 дптр
- 3) 19-21 дптр
- 4) 25-32 дптр

94. Механизм развития пресбиопсии объясняется?

- 1) ухудшением эластичности хрусталика
- 2) способность аккомодировать становится меньше
- 3) ухудшается тонус цилиарной мышцы, нарушается целостность цинновых связок
- 4) склерозируется хрусталик

95. Особенностью белкового строения хрусталика является?

- 1) превалирование альбуминовой фракции над глобулиновой
- 2) превалирование глобулиновой фракции
- 3) чужеродность белков в сравнении с белками организма
- 4) повышенное содержание белков в сравнении с другими структурами организма

96. К приобретенным заболеваниям хрусталика относятся?

- 1) помутнение хрусталика(катаракта)
- 2) воспаление
- 3) опухоли
- 4) "полярная " катаракта

97. При любом воздействии хрусталик?

- 1) набухает и мутнеет
- 2) воспаляется

- 3) сморщивается
- 4) в его ядро врастают сосуды

98. К сосудам, питающих хрусталиковое вещество взрослого человека, относятся?

- 1) а. Hyaloidea
- 2) передние ресничные артерии
- 3) короткие ресничные артерии
- 4) кровоснабжения нет

99. Основным методом исследования глаза при определении клинической формы катаракты является?

- 1) визометрия
- 2) биомикроскопия
- 3) офтальмоскопия
- 4) ультразвуковая эхоофтальмография

100. Метод проверки ретинальной остроты зрения служит для?

- 1) более точного определения рефракции у больного
- 2) исследования зрения до операции
- 3) исследования после операции
- 4) определения возможного оптического исхода после операции

101. Эндотелиальная микроскопия проводится у больных с катарактой с целью?

- 1) определения плотности заднего эпителия роговицы в квадратном мм
- 2) определения хирургической тактики лечения
- 3) выборы метода экстракции катаракты
- 4) профилактики и выявления отдельных осложнений в роговице

102. К прогрессирующей катаракте можно отнести?

- 1) врожденную слоистую катаракту
- 2) врожденную полную катаракту
- 3) приобретенную катаракту
- 4) веретенообразную катаракту

103. Диабетическая катаракта характеризуется?

- 1) истончением передней капсулы
- 2) сочетанием помутнений в хрусталике с изменением на глазном дне
- 3) наличием помутнений в зоне отщепления
- 4) сочетанием с офтальмогипертензией

104. К операции кератофакции прибегают с целью коррекции?

- 1) высокой степени миопии
- 2) высокой степени гиперметропии
- 3) афакии
- 4) сложного миопического астигматизма

105. Неправильная проекция света у больного с катарактой указывает на?

- 1) наличие зрелой катаракты у больного
- 2) наличие незрелой катаракты
- 3) патологию сетчатки и зрительного нерва
- 4) патологию роговицы

106. Толщину хрусталика и длину передне- задней оси глаза можно определить?

- 1) с помощью биомикроскопии
- 2) с помощью пахиметрии
- 3) посредством ультразвуковой эхоофтальмографии
- 4) с помощью рентгенологического метода

107. Электрофизиологические исследования сетчатки и зрительного нерва при катаракте необходимы для?

- 1) прогноза зрения после экстакции катаракты
- 2) определения хирургической тактики лечения
- 3) определения необходимости проведения курса консервативной терапии перед операцией
- 4) выработки постхирургической тактики лечения

108. К группе осложненных катаракт относится?

- 1) факотопической катаракты
- 2) катаракта при глаукоме
- 3) набухающая катаракта
- 4) катаракта при пигментном ретините

109. При обследовании больного в проходящем свете определяются розовый рефлекс, на фоне которого отмечаются подвижные черные штрихи и точки. Зрение снизилось незначительно. У данного больного можно предположить предварительный диагноз?

- 1) начальную стадию катаракты
- 2) незрелую катаракту
- 3) зрелую катаракту
- 4) помутнение в стекловидном теле

110. У больного в проходящем свете рефлекс с глазного дна слабо-розовый. При боковом освещении хрусталик приобретает отчетливо серый оттенок. Острота зрения 0,03-0,04 не корректирует. Больному следует поставить диагноз?

- 1) начальная катаракта
- 2) незрелая катаракта
- 3) зрелая катаракта
- 4) перезрелая катаракта

111. У больного рефлекса с глазного дна нет, хрусталик серый, острота зрения - правильная светопроекция. У больного?

- 1) начальная катаракта
- 2) незрелая катаракта
- 3) зрелая катаракта
- 4) перезрелая катаракта

112. У больного внутриглазное давление 34мм рт. Ст., умеренный отек роговицы, смешанная инъекция глазного яблока, передняя камера глубокая, моргание катаракта, рефлекс с глазного дна розовый. Больной считает пальцы у лица. В данном случае иммет место?

- 1) острый приступ глаукомы
- 2) иридоциклит с гипертензией
- 3) перезрелая катаракта
- 4) начальная катаракта

113. Отличием факолитической глаукомы от факоморфической является?

- 1) выраженная депигментация зрачковой каймы
- 2) атрофия радужки
- 3) открытый угол передней камеры
- 4) выраженная пигментация трабекул

114. противопоказанием к имплантации интраокулярной линзы является?

- 1) наличие соматических заболеваний в стадии декомпенсации
- 2) отсутствие парного глаза
- 3) нарушения микроциркуляции и гемодинамики в глазу
- 4) вялотекущий посттравматическийuveit

115. Тактика врача при набухающей катаракте предусматривает?

- 1) частое динамическое наблюдение с контролем ВГД и коррекцией его медикаментозно
- 2) немедленную экстракцию катаракты
- 3) больной не нуждается в наблюдении и лечении
- 4) антиглаукоматозную операцию

116. При факолитической глаукоме тактика врача должна включать?

- 1) проведение консервативного лечения, направленного на снижение ВГД
- 2) экстракцию хрусталика
- 3) экстракцию хрусталика с антиглаукоматозным компонентом
- 4) антиглаукоматозную операцию

117. Сенкаталин тормозит развитие старческой катаракты за счет?

- 1) действия, стабилизирующего мембрану
- 2) снижения ВГД
- 3) действия, направленного на улучшение микроциркуляции
- 4) подавление карбоангидразы

118. Витайдурол противопоказан при?

- 1) ядерных катарактах
- 2) задних чашеобразных катарактах
- 3) помутнениях под передней капсулой хрусталика
- 4) перивентикулярных лейкомалиях

119. Абсолютным медицинским условием и показанием к хирургическому лечению катаракт является?

- 1) зрелая катаракта
- 2) начальная катаракта
- 3) невозможность выполнения больным своей обычной работы
- 4) сублюксация мутного хрусталика

120. При двусторонней катаракте операции подлежит?

- 1) лучше видящий глаз
- 2) хуже видящий глаз
- 3) правый глаз
- 4) левый глаз

121. Травматическая катаракта без явлений набухания и иридоциклита должна оперироваться?

- 1) по неотложным показаниям в процессе первичной хирургической обработки
- 2) через 3-7 дней после травмы
- 3) через 2-4 недели после травмы
- 4) лучше решать вопрос в каждом случае индивидуально

122. Пациент обратился с клиникой острого приступа глаукомы. При этом определяется набухающая катаракта того же глаза. Тактика врача?

- 1) проведение консервативного лечения амбулаторно
- 2) проведение консервативного лечения в условиях стационара
- 3) направление в стационар для оперативного лечения по поводу острого приступа глаукомы
- 4) срочное направление в стационар для экстракции катаракты

123. У пациента двусторонняя катаракта : незрелая - на правом глазу (острота зрения = 0,1), начальная - на левом глазу (острота зрения = 0,5). Больному целесообразно предположить?

- 1) наблюдать и ждать созревания катаракты
- 2) операцию- экстракцию катаракты на правом глазу
- 3) операцию - экстракцию катаракты на правом глазу с имплантацией ИОЛ
- 4) решать вопрос в зависимости от профессии больного

124. У больного односторонняя катаракта (острота зрения =0,2). Пациент - водитель автотранспорта. Тактика лечения предполагает?

- 1) консервативное лечение
- 2) операцию экстракции катаракты с последующей оптической коррекцией очками
- 3) экстракцию катаракты с последующей коррекцией контактными линзами
- 4) экстракцию катаракты с имплантацией ИОЛ

125. Тактика офтальмолога при сочетании катаракты с глаукомой предусматривает?

- 1) экстракапсулярную экстракцию катаракты
- 2) интракапсулярную экстракцию катаракты
- 3) факоэмульсификацию
- 4) экстракапсулярную экстракцию катаракты с антиглаукоматозным компонентом

126. При синдроме Фукса определяется следующая последовательность развития осложненной катаракты?

- 1) гетерохромия, атрофия радужки, катаракта, вторичная глаукома
- 2) втройчная глаукома, гетерохромия, катаракты, атрофия радужки
- 3) атрофия радужки без гетерохромии, вторичная глаукома, катаракта
- 4) может развиваться в различной последовательности

127. Экстракцию катаракты лучше проводить под?

- 1) местным обезболиванием
- 2) местным обезболиванием с предварительной премедикацией
- 3) в/венным наркозом
- 4) эпидуральным обезболиванием

128. Одним из показаний к интракапсулярному методу экстракции катаракты является?

- 1) плотность заднего эпителия роговицы ниже 1800 клеток на кв.мм
- 2) "зрелость" хрусталика
- 3) помутнение стекловидного тела
- 4) иридофакодонез

129. Экстракапсулярная экстракция катаракты является операцией выбора при?

- 1) плотности заднего эпителия роговицы выше 1800 клеток на кв.мм
- 2) смещении хрусталика
- 3) эхографически неоднородном стекловидном теле
- 4) у пожилых людей

130 У ребенка 3 лет монокулярное сходящееся косоглазие. При обследовании выявлено: V0Д=1.0; V0S=0.06+6.0Д=0.1 Поставьте предварительный диагноз?

1. истерическая амблиопия
2. обскурационная амблиопия
3. дисбинокулярная амблиопия
4. анизометропическая амблиопия

131. ИАГ- лазеры применяются в офтальмологии для?

- 1) лечения зрелых катаракт
- 2) рассечения вторичных катарак
- 3) лазеркоагуляции сетчатки
- 4) инкапсуляции инородных тел

132 В клинику обратился больной с жалобами на плавающие мушки перед одним глазом. В анамнезе контузия глазного яблока. При обследовании в проходящем свете: плавающие хлопьевидные помутнения. Поставьте диагноз?

- 1) нитчатая деструкция стекловидного тела

- 2) зернистая деструкция стекловидного тела
- 3) полный гемофтальм
- 4) частичный гемофтальм

133. При положительной пробе Зайделя после экстракции катаракты требуется?

- 1) консервативное лечение
- 2) дополнительное наложение корнео-склеральных, либо роговичных швов
- 3) удаление старых и наложение новых швов
- 4) послойная кератопластика

134. Неосложненная грыжа стекловидного тела возникает после?

- 1) экстракции хрусталика у близоруких
- 2) витреоленсэктомии
- 3) факоэмульсификации
- 4) интракапсулярной экстракции катаракты

135. Синдром Ирвин-Гасса характеризуется?

- 1) изменениями в области хрусталика
- 2) разрастанием в области угла передней камеры
- 3) атрофией радужки
- 4) развитием макулярного отека

136 В клинику обратился больной с жалобами на покраснение глаза, умеренную болезненность. В анамнезе сифилис. Объективно: слезотечение и светобоязнь слабо выражены, на склере в области экватора два небольших очага ярко-красного цвета, с нечеткими границами, болезненные при пальпации. Поставьте диагноз?

- 1) гуттата
- 2) опухоль склеры
- 3) стафилома склеры
- 4) эписклерит

137. Наиболее оптимальным видом оптической коррекции афакии является?

- 1) очковая коррекция
- 2) контактная коррекция зрения
- 3) кератофакия
- 4) интраокулярная коррекция

138. При коррекции односторонней афакии у больных с иридоцилиарными дистрофиями преимущество имеет?

- 1) мягкая контактная линза
- 2) жесткая контактная линза
- 3) коррекция очками
- 4) интраокулярная линза

139. Причиной развития застойных ДЗН могут быть?

- 1) опухоли мозга, воспалительные процессы, травмы мозга
- 2) воспалительные процессы мозга и его оболочек
- 3) травмы мозга
- 4) демиелинизирующий процесс ЦНС

140. Электрофизиологические исследования сетчатки и зрительного нерва при катаракте необходимы для?

- 1) прогноза зрения после экстракции катаракты
- 2) определения хирургической тактики лечения
- 3) определения необходимости проведения курса консервативной терапии перед операцией

4) выработки постхирургической тактики лечения

141. У пациента двусторонняя катаракта: незрелая - на правом глазу (острота зрения =0.1), начальная -на левом глазу (острота зрения=0.8). Больному целесообразно предложить?

- 1) наблюдаться и ждать созревания катаракты
- 2) назначить ферменты в правый глаз
- 3) операцию – экстракцию катаракты на правом глазу с имплантацией интраокулярной линзы
- 4) решать вопрос в зависимости от профессии больного

142. У больного односторонняя катаракта (острота зрения=0.2). Пациент –водитель транспорта. Тактика лечения предполагает?

- 1) консервативное лечение;
- 2) операцию экстракции катаракты с последующей оптической коррекцией очками;
- 3) экстракцию катаракты с последующей коррекцией контактными линзами;
- 4) экстракцию катаракты с имплантацией ИОЛ;

143. Пациент обратился с клиникой острого приступа глаукомы. При этом определяется набухающая катаракта того же глаза. Тактика врача?

- 1) проведение консервативного лечения амбулаторно
- 2) проведение консервативного лечения в условиях стационара
- 3) направление в стационар для оперативного лечения по поводу острого приступа глаукомы;
- 4) срочное направление в стационар для экстракции катаракты

144. У больного в проходящем свете рефлекс с глазного дна слабо розовый. При боковом освещении хрусталик приобретает отчетливо серый оттенок. Острота зрения 0,03-0,04, не корректирует. Больному следует поставить диагноз?

- 1) начальной катаракты
- 2) незрелой катаракты
- 3) зрелой катаракты
- 4) перезрелой катаракты

145. У больного рефлекса с глазного дна нет, хрусталик серый, острота зрения -правильная светопроекция. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) начальная катаракта
- 2) незрелая катаракта
- 3) зрелая катаракта
- 4) перезрелая катаракта

146. Отличием факолитической глаукомы от факоморфической является?

- 1) выраженная депигментация зрачковой каймы
- 2) атрофия радужки
- 3) открытый угол передней камеры
- 4) выраженная пигментация трабекул

147. Для 3 стадии диабетической ангиоретинопатии характерны следующие офтальмологические изменения?

- 1) кровоизлияния в стекловидное тело с началом пролиферации, неоваскуляризации на диске зрительного нерва
- 2) отслойка сетчатки
- 3) макулодистрофия
- 4) тромбоз полный или неполный центральной вены сетчатки или ее ветви

148. У ребенка содружественное косоглазие, острота зрения лучшего глаза с коррекцией  $(+3.0\text{Д}=0.9)$ ; на худшем глазу с максимальной коррекцией  $(+4.0\text{Д}=0.1)$ . Поставьте предварительный диагноз?

1. истерическая амблиопия
2. обскурационная амблиопия
3. дисбинокулярная амблиопия
4. анизометрическая амблиопия
5. рефракционная амблиопия

149. У ребенка 5 лет после экстракции врожденной катаракты на обоих глазах острота зрения с коррекцией  $+10.0\text{Д}=0.08$ . Поставьте предварительный диагноз?

1. афакия, истерическая амблиопия
2. афакия, обскурационная амблиопия
3. афакия, дисбинокулярная амблиопия
4. афакия, анизометрическая амблиопия
5. афакия, рефракционная амблиопия

150 У ребенка 6 лет монокулярное сходящееся косоглазие. При обследовании выявлено:  $V0\text{Д}=0.1+3.0\text{Д}=1.0; V0S=0.1+5.0\text{Д}=0.2$  Поставьте предварительный диагноз?

1. истерическая амблиопия
2. обскурационная амблиопия
3. дисбинокулярная амблиопия
- 4.рефракционная амблиопия

151 У ребенка 3 лет монокулярное сходящееся косоглазие. При обследовании выявлено:  $V0\text{Д}=1.0; V0S=0.06+6.0\text{Д}=0.1$  Поставьте предварительный диагноз?

1. истерическая амблиопия
2. обскурационная амблиопия
3. дисбинокулярная амблиопия
4. анизометрическая амблиопия

152 Больному 20-ти лет произведена керотопластика на правом глазу. В детстве перенес ожог глаза известью. После операции:  $V0\text{Д}=0.02-3.0\text{Д}=0.06$ . Поставьте предварительный диагноз?

1. истерическая амблиопия
2. обскурационная амблиопия
3. дисбинокулярная амблиопия
4. анизометрическая амблиопия

153 В клинику обратился больной с жалобами на слезотечение, гнойное отделяемое, отек век, правой половины лица, головную боль, общее недомогание, повышение температуры. Объективно: резкий отек век, глазная щель закрыта, отек распространяется на правую половину щеки, у внутреннего угла глаза пальпируется плотный инфильтрат. Поставьте диагноз?

1. острый эпидемический конъюктивит
2. абсцедирующий ячмень нижнего века
3. дакриоаденит
4. флегмона слезного мешка

154 Мужчина 45 лет обратился с жалобами на упорное слезотечение правого глаза. Два года назад попал в автокатастрофу. Объективно: справа рубцовый выворот нижнего века, искривление носовой перегородки, при промывании слезных путей жидкость выходит через верхнюю слезную точку. Причина этого?

1. выворот слезной точки

2. хронический дакриоцистит
3. выворот нижнего века
4. флегмона слезного мешка

155 У ребенка в первые дни жизни появилось слезотечение, слизисто-гнойное отделяемое из обоих глаз. При надавливании на область слезного мешка из нижней слезной точки выдавливается гной. Поставьте диагноз?

1. конъюнктивит новорожденных
2. гонобленорея новорожденных
3. острый эпидемический конъюнктивит
4. врожденный дакриоцистит

156 В клинику обратился больной с жалобами на слезотечение, гнойное отделяемое из глаза в течение 2 лет. Объективно: конъюнтива нижнего века гиперемирована. При надавливании на область слезного мешка из нижней слезной точки выдавливается гной. Поставьте диагноз?

1. хронический конъюнктивит
2. лагофталм
3. хронический дакриоцистит
4. атрезия слезных точек

157 У ребенка 6-ти месячного возраста после гриппа появился резкий отек и гиперемия век одного глаза. В верхне-наружном квадранте орбиты пальпируется инфильтрат. Глазное яблоко смещено книзу, ограничено в подвижности. Предушные регионарные лимфоузлы увеличены, лихорадочное состояние. Поставьте диагноз?

1. абсцедирующий ячмень верхнего века
2. абсцесс верхнего века
3. отек Квинке
4. дакриоаденит

158 Больной был расстроен, ночью не спал. Утром появились сильные боли в правой половине головы и глаза, туман перед глазами, радужные круги. Объективно: застойная инъекция, роговица отечная, передняя камера мелкая, зрачок расширен. Пальпаторно вгд повышено. Поставьте диагноз?

- 1) острый иридоциклит
- 2) острый кератит
- 3) острый приступ глаукомы
- 4) набухающая катаракта

159 Больной 60 лет жалуется на понижение зрения в течение полугода. При осмотре: глаза спокойные, небольшое слезотечение. ВГД пальпаторно нормальное, роговица не изменена, передняя камера средней глубины. Реакция зрачка на свет живая, просвет зрачка "серого цвета". Рефлекса с глазного дна нет. Острота зрения - счет пальцев у лица. При промывании слезных путей - жидкость проходит в нос с трудом. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) хронический дакриоцистит
- 2) хронический блефарит
- 3) старческая катаракта, дакриostenоз
- 4) первичная открытоугольная глаукома

160 У ребенка в возрасте 3 лет появились жалобы на отклонение правого глаза кнутри. Объективно: глаза спокойные, правый глаз отклонен кнутри. ВГД пальпаторно нормальное. Размер глазного яблока соответствует возрасту, цвет зрачка серый. Рефлекса с глазного дна нет. Поставьте диагноз?

- 1) врожденная катаракта
- 2) врожденная глаукома
- 3) ретинобластома
- 4) бельмо

161. У больного резко снизилось зрение, появилась "завеса" перед глазом, в анамнезе прогрессирующая миопия. Поставьте диагноз заболевания?

- 1) эмболия центральной артерии сетчатки
- 2) отслойка сетчатки
- 3) тромбоз центральной вены сетчатки
- 4) дистофия сетчатки

162. Больной жалуется на появившийся дефект в поле зрения, через который отсутствует зрительное восприятие. Это?

- 1) положительная скотома
- 2) отрицательная скотома
- 3) врожденная
- 4) физиологическая

163. Больной жалуется на дефект в поле зрения через которое частично сохраняется предметное зрение. Это?

- 1) положительная скотома
- 2) отрицательная скотома
- 3) абсолютная скотома
- 4) физиологическая скотома

164 Больной не жалуется на дефект в поле зрения, который выявляется только инструментально, через него не сохраняется предметное восприятие. Это?

- 1) положительная скотома
- 2) отрицательная скотома
- 3) относительная скотома
- 4) физиологическая скотома

165 Больной обратился в клинику с жалобами на сильные боли в правом глазу, снижение зрения. За несколько дней до этого были катаральные явления и субфибрильная температура. Объективно: смешанная инъекция, зрачок узкий, радужная оболочка изменена в цвете по сравнению с другим глазом. Отмечается болезненность глаза при пальпации. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) острый приступ глаукомы
- 2) острый иридоциклит
- 3) набухающая катаракта
- 4) язвенный кератит

166 Больной обратился с жалобами на понижение зрения в левом глазу, тупые боли, покраснение глаза. В анамнезе туберкулез легких. При осмотре: умеренная перикорнеальная инъекция, сальные преципитаты на задней поверхности роговицы, грубые задние синехии, помутнение стекловидного тела. Поставьте диагноз?

- 1) закрытоугольная глаукома
- 2) заднийuveit
- 3) панuveit
- 4) переднийuveit

167 Больной на протяжении нескольких часов в ветреную погоду выполнял электросварочные работы. Вечером у него появились светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, гиперемия конъюнктивы обоих глаз. Вероятным заболеванием может быть?

- 1) бактериальный конъюнктивит
- 2) внутренний ячмень века
- 3) аллергический конъюнктивит
- 4) электрофтальмия

168 В клинику обратился больной с жалобами на плавающие мушки перед одним глазом. В анамнезе контузия глазного яблока. При обследовании в проходящем свете: плавающие хлопьевидные помутнения. Поставьте диагноз?

- 1) нитчатая деструкция стекловидного тела
- 2) зернистая деструкция стекловидного тела
- 3) полный гемофтальм
- 4) частичный гемофтальм

169 Больной получил травму глаза. При осмотре: глаз раздражен, передняя камера глубокая, в области зрачка определяется грыжа стекловидного тела. Приставление к глазу линзы +10,0 Д улучшает зрение. Поставьте диагноз?

- 1) проникающее ранение склеры
- 2) подвывих хрусталика
- 3) проникающее ранение роговицы
- 4) вывих хрусталика в стекловидное тело

170 Больной получил тупую травму глаза. Обратился с жалобами на снижение зрения. При осмотре выявлено: передний отрезок без особенностей, острота зрения 0,02. Офтальмоскопия глазного дна выявила вуалеподобную пленку серого цвета, которая колышится при движениях глаза. Поле зрения сужено в нижне-внутреннем квадранте. Диагноз, дополнительные симптомы?

- 1) частичный гемофтальм
- 2) отслойка цилиарного тела
- 3) разрыв сетчатки
- 4) отслойка сосудистой

171 В клинику обратился больной жалобами на отсутствие предметного зрения на одном глазу. В анамнезе контузия глазного яблока. При исследовании методом диафаноскопии, рефлекс отсутствует. Поставьте диагноз?

- 1) травматическая катаракта
- 2) отслойка сетчатки
- 3) частичный гемофтальм
- 4) полный гемофтальм

172 Больной 40 лет. Жалуется на периодическую тяжесть в глазу, головные боли, затуманивание зрения, особенно при наклоне головы. Объективно: глаз спокоен, роговица прозрачная, передняя камера мельче средней. Глазное дно: на диске зрительного нерва отмечается сдвиг сосудистого пучка в носовую сторону. Функции не изменены. Поставьте диагноз?

- 1) начальная закрытоугольная глаукома
- 2) начинающаяся катаракта
- 3) невралгия тройничного нерва
- 4) гипертоническая нейроретинопатия

173 Больной обратился с жалобами на боли в глазу, летающие мушки перед глазом, снижение зрения. Объективно: перикорнеальная инъекция, на задней поверхности роговицы имеются отложения серого цвета, зрачок неправильной формы, при исследовании методом проходящего света в стекловидном теле видны плавающие помутнения. Поставьте диагноз?

- 1) закрытоугольная глаукома
- 2)uveit
- 3) катаракта
- 4) кератит

174 Больной почувствовал боли в правом глазу, снижение зрения, глаз покраснел, изменился в цвете. При осмотре: смешанная инъекция глазного яблока, радужная оболочка зеленоватого цвета, зрачок узкий, при пальпации отмечается резкая болезненность. С глазного дна розовый рефлекс. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) гемофтальм

- 2) сидероз
- 3) острый приступ глаукомы
- 4) иридоциклит

175 Больной заметил беспорядочные плавающие мушки перед левым глазом, резкое ухудшение остроты зрения. Объективно: глаз спокоен, передний отрезок глаза не изменен. При офтальмоскопии в макулярной области виден очаг желто-серого цвета с нечеткими границами, размером в полтора диаметра диска зрительного нерва. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) дегенерация сетчатки
- 2) деструкция стекловидного тела
- 3) центральный хориоретинит
- 4) иридоциклит

176 Девочка 15 лет перенесла гнойный гидраденит в правой подмышечной впадине. Через 2 дня появились боли в правом глазу, резко ухудшилось зрение, повысилась температура тела. Объективно: экзофталм, хемоз конъюнктивы, ограничение движений глазного яблока. Роговица прозрачная, при исследовании в проходящем свете виден желтого цвета экссудат. Поставьте диагноз?

- 1) гнойный иридоциклит
- 2) метастатическая офтальмия
- 3) острый приступ глаукомы
- 4) ретробульбарный неврит

177 В клинику обратился молодой человек 27 лет с жалобами на боли в глазу, снижение зрения. Объективно: острая зрения 0,1. Глаз раздражен, передняя камера мелкая, зрачок неправильной формы, подтянут к лимбу на 3 часах. В этом месте видно темное округлое образование. Болен в течении 12 часов. Ваш предполагаемый диагноз?

- 1) меланома радужки
- 2) пигментное пятно радужки
- 3) проникающее ранение лимба
- 4) новообразование лимба

178 У больного на протяжении 1 года был правосторонний хронический дакриоцистит. Два дня назад во время уборки квартиры в правый глаз попала соринка. За помощью никуда не обращался. Самостоятельно закапывал какие-то глазные капли, улучшения не наступило. При осмотре: острая зрения 0,1. Глаз раздражен. На роговице в центре видно серое образование. На дне передней камеры горизонтальный уровень желтоватой жидкости. Ваш предполагаемый диагноз?

- 1) травматический кератит
- 2) иридоциклит
- 3) язва роговицы
- 4) катаракта

179 После перенесенной вирусной инфекции у больного появилось постепенное снижение зрения. При обследовании: диск зрительного нерва гиперемирован, границы стушеваны, увеличен размер слепого пятна. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) ретробульбарный неврит
- 2) неврит зрительного нерва
- 3) застойный сосок
- 4) папиллит

180 В анамнезе у больного черепно-мозговая травма. На глаза не жалуется. Объективно: зрительные функции в норме. При исследовании определяется увеличение размеров слепого пятна. На глазном дне ДЗН увеличен в размерах, границы его размыты, сосуды расширены, извиты. Скиаскопически в макуле эмметропия, над диском гиперметропия 9,0 диоптрий. Поставьте диагноз? Тактика?

- 1) неврит зрительного нерва, лечение в глазном отделении
- 2) ретробульбарный неврит, госпитализация в неврологическое отделение

- 3) застойный сосок, декомпрессия черепа в отделении нейрохирургии  
4) папиллит, экстренное хирургическое вмешательство

181 У больного при обследовании обнаружена опухоль лобной доли головного мозга в сочетании с атрофией зрительного нерва на одном глазу и застойным соском на другом. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) восходящая атрофия зрительного нерва
- 2) синдром Рейтера
- 3) болезнь Вагнера
- 4) синдром Фостера-Кеннеди

182 У больного жалобы на боли при движениях глазного яблока, резкое понижение зрения. Неделю назад переболел гриппом. Передний отрезок глазного яблока без изменений, офтальмоскопическая картина без особенностей. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) ретробульбарный неврит
- 2) папиллит
- 3) ретиноваскулит
- 4) ретинит

183 У больного, страдающего гипертонической болезнью, внезапно перед глазом появился туман с последующим значительным постепенным снижением зрения. При офтальмоскопии обнаружено: ДЗН темнокрасный, отечен, обширные радиарно расположенные ретинальные кровоизлияния. Вены темные, извитые, неравномерного колибра полнокровные. Причины этого?

- 1) эмболия центральной артерии сетчатки
- 2) тромбоз центральной вены сетчатки
- 3) болезнь Ильса
- 4) острый частичный гемофтальм

184 У больного жалобы на боли при движении глазного яблока, резкое снижение зрения. При обследовании выявлена центральная скотома. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) нисходящая атрофия зрительного нерва
- 2) ретробульбарный неврит
- 3) центральный серозный ретинит
- 4) оптико-хиазмальный арахноидит

185. Жалобы больного на постепенное снижение зрения. При обследовании выявлено сужение поля зрения. В анамнезе черепномозговая травма. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) ретробульбарный неврит
- 2) застойный сосок зрительного нерва
- 3) неврит зрительного нерва
- 4) нисходящая атрофия зрительного нерва

186 У больного угол отклонения ксящего глаза составляет 30 градусов внутрь, имеется гиперметропия 2,0 Д. При приставлении к глазу стекла +2,0 Д, угол девиации кнутри уменьшается до 15 градусов по Гиршбергу. Поставьте диагноз?

- 1) аккомодационное косоглазие
- 2) неаккомодационное косоглазие
- 3) частично аккомодационное косоглазие
- 4) альтернирующее косоглазие

187. У больного атрофия зрительного нерва одного глаза и застойный сосок другого глаза. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) синдром Франческетти
- 2) синдром Фостера-Кеннеди
- 3) болезнь Съегрена
- 4) синдром Гиппеля-Линдау

188. У больного обнаружена триада Гетчинсона и паренхиматозный кератит. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) синдром Чарлена
- 2) туберкулезный кератит
- 3) сифилитический кератит
- 4) болезнь Люиса

189 В клинику обратился больной с жалобами на полную потерю зрения на правом глазу. В анамнезе: зрение упало после гипертонического криза. При обследовании в проходящем свете рефлекта нет. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) эмболия центральной артерии сетчатки
- 2) частичный гемофтальм
- 3) полный гемофтальм
- 4) отслойка сетчатки

190 В клинику обратился больной с жалобами на покраснение глаза, умеренную болезненность. В анамнезе сифилис. Объективно: слезотечение и светобоязнь слабо выражены, на склере в области экватора два небольших очага ярко-красного цвета, с нечеткими границами, болезненные при пальпации. Поставьте диагноз?

- 1) гуттата
- 2) опухоль склеры
- 3) стафилома склеры
- 4) эписклерит

191. В клинику обратился больной с жалобами на снижение зрения на одном глазу. В анамнезе перенес увеит с повышением ВГД. При обследовании острота зрения этого глаза: 0,2 -сул 2,0 Д, ах 192 = 0,9-1,0. Объективно: на поверхности склеры на 3 мм от лимба имеется бугристое темное выпячивание, размером 4 мм х 6 мм. Поставьте диагноз?

- 1) склеромаляция
- 2) эписклерит
- 3) склерит
- 4) стафилома

193 В клинику обратился больной 72 лет с жалобами на слезотечение из обоих глаз в течение 3-х месяцев. Объективно: слезостояние, коньюктивида век слегка гиперемирована. При промывании слезных путей жидкость в нос проходит капельно. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) хронический коньюктивит
- 2) сужение слезных точек
- 3) выворот нижнего века
- 4) сужение носослезных каналов

194 У больного расходящееся косоглазие 12 градусов, угол его не изменяется при приставлении плюсовых и минусовых стекол. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) аккомодационное косоглазие
- 2) неаккомодационное косоглазие
- 3) частично аккомодационное косоглазие
- 4) альтернирующее косоглазие

195 У больного жалобы на нарушение сумеречного зрения. Объективно: концентрическое сужение полей зрения, на глазном дне симптом "костных телец". Поставьте предварительный диагноз?

- 1) дальтонизм
- 2) "куриная слепота"
- 3) пигментная дистрофия
- 4) желточная дистрофия Беста

196 У больного на роговице поверхностные субэпителиальные монетовидные помутнения, поверхность роговицы отечная. При осмотре яркая гиперемия зева, увеличены лимфатические узлы. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) фликтенулезный кератит
- 2) герпетический субэпителиальный кератит
- 3) аденоизический кератит
- 4) дисковидный кератит

197. У больного прогрессирующее одностороннее концентрическое сужение поля зрения. Необходимо исключить?

- 1) опухоль головного мозга
- 2) тапеторетинальную дистрофию сетчатки
- 3) открытоглазую глаукому
- 4) неврит зрительного нерва

198 У больного двухстороннее трубочное поле зрения. Какие заболевания необходимо исключить?

- 1) менингит
- 2) глаукому
- 3) неврастению
- 4) атеросклероз мозговых сосудов

199. Причиной отслойки сетчатки не может быть?

- 1) Кистовидная дегенерация сетчатки.
- 2) Посттравматический разрыв сетчатки.
- 3) Неврит зрительного нерва.
- 4) Витреоретинальная пролиферация.

200. При коррекции монокулярной афакии обычными очковыми стеклами бинокулярное зрение невозможно по причине?

- 1) Слепящего действия очкового стекла на афакичный глаз.
- 2) Выраженных явлений диплопии.
- 3) Высокой анизометропии.
- 4) Появления хроматических aberrаций.

201. У больного в проходящем свете рефлекс с глазного дна слабо-розовый. При боковом освещении хрусталик приобретает отчетливо серый оттенок. Острота зрения 0,03-0,04 не корректируется. Больному следует поставить диагноз?

- 1) начальная катаракта
- 2) незрелая катаракта
- 3) зрелая катаракта
- 4) перезрелая катаракта

202. В клинику обратился больной с жалобами на покраснение, выраженную светобоязнь и слезотечение на левом глазу. Объективно: в склере несколько очагов краснофиолетового цвета, возвышающиеся над склерой, болезненные при пальпации. В процесс вовлечена роговица. Больной страдает ревматизмом и отмечает, что подобное состояние бывает часто на протяжении последних лет. Поставьте диагноз?

- 1) кератоирдоцикличит
- 2) кератосклерит
- 3) эктазия склеры
- 4) эписклерит

203. Больному 20-ти лет произведена кератопластика на правом глазу. В детстве перенес ожог глаза известью. После операции: V0Д=0.02-3.0Д=0.06. Больному следует поставить диагноз?

1. истерическая амблиопия

2. обскурационная амблиопия
3. дисбинокулярная амблиопия
4. анизометрическая амблиопия

204. В клинику обратился больной с жалобами на слезотечение, гнойное отделяемое, отек век, правой половины лица, головную боль, общее недомогание, повышение температуры. Объективно: резкий отек век, глазная щель закрыта, отек распространяется на правую половину щеки, у внутреннего угла глаза пальпируется плотный инфильтрат. Поставьте диагноз?

1. острый эпидемический конъюнктивит
2. абсцедирующий ячмень нижнего века
3. дакриоаденит
4. флегмона слезного мешка

205. Мужчина 45 лет обратился с жалобами на упорное слезотечение правого глаза. Два года назад попал в автокатастрофу. Объективно: справа рубцовый выворот нижнего века, искривление носовой перегородки, при промывании слезных путей жидкость выходит через верхнюю слезную точку. Причина этого?

1. выворот слезной точки
2. хронический дакриоцистит
3. выворот нижнего века
4. флегмона слезного мешка

206. Больной был расстроен, ночью не спал. Утром появились сильные боли в правой половине головы и глаза, туман перед глазами, радужные круги. Объективно: застойная инъекция, роговица отечная, передняя камера мелкая, зрачок расширен. Пальпаторно вгд повышен. Больному следует поставить диагноз?

- 1) острый иридоциклит
- 2) острый кератит
- 3) острый приступ глаукомы
- 4) набухающая катаректа

207. Больной 60 лет жалуется на понижение зрения в течение полугода. При осмотре: глаза спокойные, небольшое слезотечение. ВГД пальпаторно нормальное, роговица не изменена, передняя камера средней глубины. Реакция зрачка на свет живая, просвет зрачка "серого цвета". Рефлекса с глазного дна нет. Острота зрения - счет пальцев у лица. При промывании слезных путей - жидкость проходит в нос с трудом. Поставить предварительный диагноз?

- 1) хронический дакриоцистит
- 2) хронический блефарит
- 3) старческая катаректа, дакриostenоз
- 4) первичная закрытоугольная глаукома

208. Больной обратился с жалобами на понижение зрения в левом глазу, тупые боли, покраснение глаза. В анамнезе туберкулез легких. При осмотре: умеренная перикорнеальная инъекция, сальные преципитаты на задней поверхности роговицы, грубые задние синехии, помутнение стекловидного тела. Поставить предварительный диагноз?

- 1) закрытоугольная глаукома
- 2) заднийuveit
- 3) панувеит
- 4) переднийuveit

209. Больной на протяжении нескольких часов в ветреную погоду выполнял электросварочные работы. Вечером у него появились светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, гиперемия конъюнктивы обоих глаз. Вероятным заболеванием может быть?

- 1) бактериальный конъюнктивит
- 2) внутренний ячмень века
- 3) аллергический конъюнктивит
- 4) электрофтальмия

210. В клинику обратился больной с жалобами на плавающие мушки перед одним глазом. В анамнезе контузия глазного яблока. При обследовании в проходящем свете: плавающие хлопьевидные помутнения. Больному следует поставить диагноз?

- 1) нитчатая деструкция стекловидного тела
- 2) зернистая деструкция стекловидного тела
- 3) полный гемофтальм
- 4) частичный гемофтальм

211. Больной получил травму глаза. При осмотре: глаз раздражен, передняя камера глубокая, в области зрачка определяется грыжа стекловидного тела. Приставление к глазу линзы +10,0 Д улучшает зрение. Поставить предварительный диагноз?

- 1) проникающее ранение склеры
- 2) подвывих хрусталика
- 3) проникающее ранение роговицы
- 4) вывих хрусталика в стекловидное тело

212 Мужчина 45 лет обратился с жалобами на упорное слезотечение правого глаза. Два года назад попал в автокатастрофу. Объективно: справа рубцовый выворот нижнего века, искривление носовой перегородки, при промывании слезных путей жидкость выходит через верхнюю слезную точку. Причина этого?

1. выворот слезной точки
2. хронический дакриоцистит
3. выворот нижнего века
4. флегмона слезного мешка

213. Больной получил тупую травму глаза. Обратился с жалобами на снижение зрения. При осмотре выявлено: передний отрезок без особенностей, острота зрения 0,02. Офтальмоскопия глазного дна выявила вуалеподобную пленку серого цвета, которая колышится при движениях глаза. Поле зрения сужено в нижне-внутреннем квадранте. Диагноз, дополнительные симптомы?

- 1) частичный гемофтальм
- 2) отслойка цилиарного тела
- 3) разрыв сетчатки
- 4) травматическая катаракта

214. В клинику обратился больной жалобами на отсутствие предметного зрения на одном глазу. В анамнезе контузия глазного яблока. При исследовании методом диафаноскопии, рефлекс отсутствует. Больному следует поставить диагноз?

- 1) травматическая катаракта
- 2) отслойка сетчатки
- 3) частичный гемофтальм
- 4) полный гемофтальм

215. Больной 40 лет. Жалуется на периодическую тяжесть в глазу, головные боли, затуманивание зрения, особенно при наклоне головы. Объективно: глаз спокоен, роговица прозрачная, передняя камера мельче средней. Глазное дно: на диске зрительного нерва отмечается сдвиг сосудистого пучка в носовую сторону. Функции не изменены. Поставьте диагноз?

- 1) начальная закрытоугольная глаукома
- 2) начинающаяся катаракта
- 3) невралгия тройничного нерва
- 4) гипертоническая нейроретинопатия

216. Больной обратился с жалобами на боли в глазу, летающие мушки перед глазом, снижение зрения. Объективно: перикорнеальная инъекция, на задней поверхности роговицы имеются отложения серого цвета, зрачок неправильной формы, при исследовании методом проходящего света в стекловидном теле видны плавающие помутнения. Больному следует поставить диагноз?

- 1) закрытоугольная глаукома

- 2) увеит
- 3) катаракта
- 4) кератит

217. Больной почувствовал боли в правом глазу, снижение зрения, глаз покраснел, изменился в цвете. При осмотре: смешанная инъекция глазного яблока, радужная оболочка зеленоватого цвета, зрачок узкий, при пальпации отмечается резкая болезненность. С глазного дна розовый рефлекс. Поставьте диагноз?

- 1) гемофтальм
- 2) сидероз
- 3) острый приступ глаукомы
- 4) иридоциклит

218. Больной заметил беспорядочные плавающие мушки перед левым глазом, резкое ухудшение остроты зрения. Объективно: глаз спокоен, передний отрезок глаза не изменен. При офтальмоскопии в макулярной области виден очаг желто-серого цвета с нечеткими границами, размером в полтора диаметра диска зрительного нерва. Поставьте диагноз?

- 1) дегенерация сетчатки
- 2) деструкция стекловидного тела
- 3) центральный хориоретинит
- 4) иридоциклит

219. Девочка 15 лет перенесла гнойный гидраденит в правой подмышечной впадине. Через 2 дня появились боли в правом глазу, резко ухудшилось зрение, повысилась температура тела. Объективно: экзофтальм, хемоз конъюнктивы, ограничение движений глазного яблока. Роговица прозрачная, при исследовании в проходящим светом виден желтого цвета экссудат. Поставьте диагноз?

- 1) гнойный иридоциклит
- 2) метастатическая офтальмия
- 3) острый приступ глаукомы
- 4) ретробульбарный неврит

220. В клинику обратился молодой человек 27 лет с жалобами на боли в глазу, снижение зрения. Объективно: острота зрения 0,1. Глаз раздражен, передняя камера мелкая, зрачок неправильной формы, подтянут к лимбу на 3 часах. В этом месте видно темное округлое образование. Болен в течении 12 часов. Ваш предполагаемый диагноз?

- 1) меланома радужки
- 2) пигментное пятно радужки
- 3) проникающее ранение лимба
- 4) новообразование лимба

221. У больного на протяжении 1 года был правосторонний хронический дакриоцистит. Два дня назад во время уборки квартиры в правый глаз попала соринка. За помощью никуда не обращался. Самостоятельно закапывал какие-то глазные капли, улучшения не наступило. При осмотре: острота зрения 0,1. Глаз раздражен. На роговице в центре видно серое образование. На дне передней камеры горизонтальный уровень желтоватой жидкости. Ваш предполагаемый диагноз?

- 1) травматический кератит
- 2) иридоциклит
- 3) язва роговицы
- 4) катаракта

222. После перенесенной вирусной инфекции у больного появилось постепенное снижение зрения. При обследовании: диск зрительного нерва гиперемирован, границы стушеваны, увеличен размер слепого пятна. Больному следует поставить диагноз?

- 1) ретробульбарный неврит
- 2) неврит зрительного нерва
- 3) застойный сосок

4) папилит

223.Нерв, иннервирующий мышцу, поднимающую верхнее веко (m. levator palpebrae superior)?

- 1)N. Facialis
- 2)N. Nasociliaris
- 3)N. Opticus
- 4)N. Oculomotorius

224.Порция круговой мышцы века, участвующая в смыкании глазной щели при мигании?

- 1)Пальпебральная
- 2)Орбитальная
- 3)Слезная
- 4)Конъюнктивальная

225.Нерв, иннервирующий круговую мышцу глаза (m. orbicularis oculi)?

- 1)N. Facialis
- 2)N. Nasociliaris
- 3)N. Opticus
- 4)N. Oculomotorius

226.Лимфатические сосуды верхнего века впадают в лимфатические узлы?

- 1)Предушные
- 2)Подчелюстные
- 3)Затылочные
- 4)Шейные

227.Лимфатические сосуды нижнего века впадают в лимфатические узлы?

- 1)Предушные
- 2)Подчелюстные
- 3)Затылочные
- 4)Шейные

228.Чувствительная иннервация роговицы осуществляется?

- 1)N. Facialis
- 2)N. Nasociliaris
- 3)N. Ophthalmicus
- 4)N. Oculomotorius

229.Двигательная иннервацию век осуществляется?

- 1)N. Facialis
- 2)N. Nasociliaris
- 3)N. Ophthalmicus
- 4)N. Oculomotorius

230.Нерв, не участвующий в чувствительной иннервации конъюнктивы?

- 1)N. Maxillaris
- 2)N. Nasociliaris
- 3)N. Lacrimalis
- 4)N. Frontalis

231.Метод исследования конъюнктивы?

- 1)Диафаноскопия. \*2. Боковое (фокальное) освещение.
- 2)Тонометрия
- 3)В проходящем свете.
- 4)Биомикроскопия

232. В клинику обратился молодой человек 27 лет с жалобами на боли в глазу, снижение зрения. Объективно: острота зрения 0,1. Глаз раздражен, передняя камера мелкая, зрачок неправильной формы, подтянут к лимбу на 3 часах. В этом месте видно темное округлое образование. Болен в течении 12 часов. Ваш предполагаемый диагноз?

- 1) меланома радужки
- 2) пигментное пятно радужки
- 3) проникающее ранение лимба
- 4) новообразование лимба

233. У больного на протяжении 1 года был правосторонний хронический дакриоцистит. Два дня назад во время уборки квартиры в правый глаз попала соринка. За помощью никуда не обращался. Самостоятельно закапывал какие-то глазные капли, улучшения не наступило. При осмотре: острота зрения 0,1. Глаз раздражен. На роговице в центре видно серое образование. На дне передней камеры горизонтальный уровень желтоватой жидкости. Ваш предполагаемый диагноз?

- 1) травматический кератит
- 2) иридоциклит
- 3) язва роговицы
- 4) катаракта

234. После перенесенной вирусной инфекции у больного появилось постепенное снижение зрения. При обследовании: диск зрительного нерва гиперемирован, границы стушеваны, увеличен размер слепого пятна. Поставьте предварительный диагноз?

- 1) ретробульбарный неврит
- 2) неврит зрительного нерва
- 3) застойный сосок
- 4) папиллит

235. Большинство глазных мышц начинается от?

- 1) Сухожильного кольца Цинна
- 2) Foramen rotundum
- 3) Верхней глазничной щели
- 4) Нижней глазничной щели

236. Иннервирует все экстраокулярные мышцы, кроме?

- 1) Внутренней прямой
- 2) Верхней косой
- 3) Нижней прямой
- 4) Нижней косой

237. Мышцы глазного яблока, не являющиеся антагонистами?

- 1) Верхняя косая и нижняя косая
- 2) Наружная прямая и внутренняя прямая
- 3) Верхняя прямая и нижняя прямая
- 4) Верхняя косая и нижняя прямая

238. Мышцы глазного яблока, являющиеся синергистами?

- 1) Нижняя косая и наружная прямая
- 2) Наружная прямая и внутренняя прямая
- 3) Верхняя прямая и наружная прямая
- 4) Нижняя прямая и наружная прямая

239. Глазная мышца, начинающаяся не от сухожильного кольца Цинна?

- 1) Наружная прямая
- 2) Внутренняя прямая
- 3) Верхняя прямая
- 4) Нижняя косая

240. Клеточные элементы сетчатки, не являющиеся нейронами?

- 1) Фоторецепторы
- 2) Глиальные клетки Мюллера
- 3) Биполярные клетки
- 4) Ганглиозные клетки

241. Анатомическое образование, не участвующее в образовании угла передней камеры?

- 1) Трабекулярная сеточка
- 2) Радужная оболочка
- 3) Цилиарное тело
- 4) Циннова связка

242. Глазодвигательная мышца, отводящая глаз?

- 1) Наружная прямая
- 2) Нижняя прямая
- 3) Верхняя прямая
- 4) Внутренняя прямая

243. Глазодвигательная мышца, приводящая глаз?

- 1) Наружная прямая
- 2) Верхняя косая
- 3) Нижняя косая
- 4) Внутренняя прямая

244. Глазодвигательная мышца, поднимающая глаз?

- 1) Наружная прямая
- 2) Нижняя косая
- 3) Нутренняя прямая
- 4) Внутренняя прямая

245. Глазодвигательная мышца, опускающая глаз?

- 1) Наружная прямая
- 2) Нижняя прямая
- 3) Верхняя прямая
- 4) Внутренняя прямая

246. Функции верхней косой мышцы?

- 1) Опускание, отведение
- 2) Поднимание, отведение
- 3) Поднимание, приведение
- 4) Опускание, приведение

247. Функции верхней прямой мышцы?

- 1) Опускание, отведение
- 2) Поднимание, отведение
- 3) Поднимание, приведение
- 4) Опускание, приведение

248. У ребенка в возрасте 3 лет появились жалобы на отклонение правого глаза кнутри.

Объективно: глаза спокойные, правый глаз отклонен кнутри. ВГД пальпаторно нормальное.

Размер глазного яблока соответствует возрасту, цвет зрачка серый. Рефлекса с глазного дна нет.

Поставьте диагноз?

- 1) врожденная катаракта
- 2) врожденная глаукома
- 3) ретинобластома
- 4) бельмо

249. Иннервация сфинктера зрачка осуществляется?

- 1)N. Oculomotorius
- 2)N. Trigeminus
- 3)N. Nasociliaris
- 4)Нервыми волокнами truncus sympatheticus

250.Иннервация дилататора зрачка осуществляется?

- 1)N. Oculomotorius
- 2)N. Trigeminus
- 3)N. Nasociliaris
- 4)Нервыми волокнами truncus sympatheticus