

Министерство образования и науки  
Кыргызской Республики

Ошский государственный университет

Медицинский факультет


СРС

Тема : «Анемия»

Выполнил(а): \_\_\_\_\_ Юсупов Т.

Проверила: \_\_\_\_\_ Оморалиева Г.О.

Группа : \_\_\_\_\_ 6ЛК-7-18 «А»



## По вертикали

1. При укушении обсега возникает при анемии в уголках рта чисто **появляются: ТРЕЩИНЫ**
2. Анемия возникающая вследствие разрушения эритроцитов: **гемолитическая**
4. Вещество которое связывает витамин В-12 в желудке, тем самым предохраняя его от расщепления желудочным соком: **гастромукопротин**
6. Симптом острой постгеморрагической анемии: **жажда**
9. Отношение объема форменных элементов крови к объему плазмы называется: **гематокрит**
10. При хроническом микроцитозе происходит увеличение: **селезенки**
12. Полезная шольская лесная ягода при анемии: **земляника**
13. Анемия которая характеризуется угнетением кроветворной функции красного костного мозга и проявляется недостаточным образованием эритроцитов, гранулоцитов и тромбоцитов или одним только эритроцитов: **гипопластическая**
15. Выбор терапии у пациентов с апластической анемией определяется индивидуально с учетом какого фактора? **коморбидного**
18. Название витамина дефицит которого может вызвать анемию: **цианокобаламин**
19. Тип анемии при котором нарушается производство всех видов кровяных клеток в костном мозге: **апластическая**
20. При аутоиммунных анемиях большое диагностическое значение имеет положительная проба! **Кумбса**
23. Эпигдемологические анемии связаны с недостатком определенных ферментов эритроцитов: **пируваткиназы**

По вертикали:

25. Препарат для выбора лечения ферритиновой анемии является: **ферумлек**
29. В-12 дефицитная анемия по цветовому показателю: **гиперхромная**

По горизонтали:

3. Гипохромный цветовой показатель характерен для анемии: **железодефицитной**
5. Изменения размеров эритроцитов с преобладанием мелких форм: **анизоцитоз**
7. Безядерные клетки, образуемые путем отщепления участков цитоплазмы от мегкариоцитов: **тромбоциты**
8. Об эффективности лечения препаратами железа свидетельствуют появление в анализе крови:

**Тромбоцитоза**

11. Другое название В-12 дефицитной анемии: **мegalобластная**

14. Один из распространённых симптомов анемии: **бледность**

16. Какая сопроводительная терапия проводится при апластической анемии: **трансфузионная**

17. Перегрузка железом в результате множественной гемотрансфузии является показанием к проведению какой терапии? **хелаторной**

21. При аутоиммунной анемии показана терапия глюкокортикоидным гормоном сокращающая или прекращающая гемолиз: **преднизалон**

22. Среди различных приобретённых вариантов анемии чаще встречаются: **аутоиммунные**

По горизонтали

24. Как называется трансплактогенная при антибиотической анемии в качестве первой линии лечения рекомендуемая для пациентов до 50 лет?  
аллогенная
26. Анемия которая развивается в результате кровопотери? постгеморрагическая
27. Железо дефицитная анемия по световому показанию и по красной
28. Кожные покровы при В-12 анемии:  
бледно желтушные
30. При остром лейкозе часто развивается  
пневмония
31. Заболевание при котором наблюдается гиперлейкоз до  $300 \times 10^9/l$   
лейкоз