

Тестовые вопросы для ординаторов по специальности Эпидемиология 1-семестр

1. Укажите пути заражения менингококковой инфекцией:
 - а) воздушно-пылевым путем
 - б) через инфицированные предметы
 - в) трансмиссивным путем
 - г) воздушно-капельным путем
2. Укажите как происходит заражение сыпным тифом:
 - а) контактным путем
 - б) воздушно-пылевым путем
 - в) при укусах кровососущих насекомых
 - г) при втирании в кожу испражнений зараженных вшей
3. Укажите заражение малярией происходит в результате укуса:
 - а) комара рода куликс
 - б) комара рода анофелес
 - в) иксодового клеща
 - г) блохи
4. Укажите пути передачи при менингококковой инфекции:
 - а) гемоконтактный
 - б) воздушно-капельный
 - в) воздушно-пылевой
 - г) алиментарный
5. Перечислите что относится к мерам профилактики ВИЧ-инфекции :
 - а) обследование всех больных
 - б) изоляция ВИЧ-инфицированных
 - в) противоэпидемический режим и сан.обработка в ЛПУ
 - г) соблюдать режим
6. Укажите что может быть источником инфекции при дифтерии:
 - а) домашние животные - носители токсигенных штаммов
 - б) одежда больного
 - в) транзитный носитель токсигенного штамма *Corynebacterium diphtheriae*
 - г) больной нетоксической формой кори
7. Назовите входные ворота при менингококковой инфекции:
 - а) кожа
 - б) раневые поверхности
 - в) верхние дыхательные пути
 - г) ЖКТ
8. Укажите в каких насекомых возбудители размножаются и накапливаются:
 - а) тараканы
 - б) клопы
 - в) платяные вши
 - г) мухи
9. Укажите в каких насекомых возбудители размножаются и накапливаются:
 - а) тараканы
 - б) клопы
 - в) блохи
 - г) мухи
10. Укажите в каких насекомых возбудители проходят половой цикл развития:
 - а) малярийные комары
 - б) блохи
 - в) клещи
 - г) мухи
11. Укажите в каких насекомых возбудители только сохраняют жизнеспособность:
 - а) малярийные комары
 - б) вши
 - в) тараканы
 - г) слепни
12. Укажите в каких насекомых возбудители размножаются, накапливаются и передаются новому поколению (трансовариально):
 - а) малярийные комары
 - б) блохи

- в) клещи
- г) мухи

13. Укажите неправильное утверждение для геогельминтозов:

- а) возбудители, покинув организм человека, должны пройти часть цикла развития в неживом организме, например, в почве,
- б) ксеноорганизмы в передачи возбудителя не участвуют,
- в) возбудители, покинув организм человека, должны пройти часть цикла развития в живом организме,
- г) составляют группу антропонозов.

14. Укажите неправильное утверждение для биогельминтозов:

- а) возбудители, покинув организм человека, должны пройти часть цикла развития в неживом организме, например, в почве
- б) в передачи возбудителя участвуют ксеноорганизмы
- в) возбудители, покинув организм человека, должны пройти часть цикла развития в живом организме
- г) пероральные и перкутанные пути заражения

15. Укажите неправильное утверждение для контактных гельминтозов:

- а) возбудители покидают организм человека зрелыми или почти зрелыми
- б) ксеноорганизмы в передачи возбудителя не участвуют
- в) возбудители, покинув организм человека, должны пройти часть цикла развития в живом организме
- г) составляют группу антропонозов

16. Укажите неправильное утверждение для контактных гельминтозов:

- а) возбудители покидают организм человека зрелыми или почти зрелыми
- б) заражение происходит при употреблении рыбы
- в) заражение происходит через грязные руки и игрушки
- г) составляют группу антропонозов

17. Укажите утверждение не характерное для профилактической дезинфекции:

- а) проводят при не выявленном источнике инфекции
- б) в местах скопления людей
- в) на водопроводных станциях и сооружениях
- г) время проведения Ц немедленное

18. Укажите утверждение не характерное для профилактической дезинфекции:

- а) проводят при не выявленном источнике инфекции
- б) на предприятиях по изготовлению пищевых продуктов
- в) на водопроводных станциях и сооружениях
- г) исполнители - медицинский персонал поликлиник

19. Укажите утверждение не характерное для заключительной дезинфекции:

- а) проводят периодически
- б) при репрофилировании инфекционного отделения
- в) после удаления источника инфекции из очага
- г) исполнители - медицинский персонал

20. Укажите заключительную дезинфекцию в очаге не проводят в следующем случае:

- а) больной корью переведен из палаты терапевтического отделения в изолятор
- б) в связи с изменением эпидемической обстановки отделение для больных дизентерией репрофилируется для приема больных гриппом;
- в) отделение для больных вирусными гепатитами репрофилируется для больных дизентерией
- г) больной брюшным тифом госпитализирован в инфекционную больницу из отдельной квартиры

21. Укажите заключительную дезинфекцию в очаге не проводят в следующем случае:

- а) отделение для больных вирусными гепатитами репрофилируется для больных дизентерией
- б) в связи с изменением эпидемической обстановки отделение для больных гриппом репрофилируется для приема больных дизентерией
- в) больной легочной формой чумы переведен из бокса в отделение
- г) больной брюшным тифом госпитализирован в инфекционную больницу из отдельной квартиры

22. Укажите заключительную дезинфекцию в очаге проводят в следующем случае:

- а) отделение для больных вирусными гепатитами репрофилируется для больных дизентерией
- б) в связи с изменением эпидемической обстановки отделение для больных гриппом репрофилируется для приема больных дизентерией
- в) больной туляемией переведен из бокса в отделение
- г) больной корью переведен из палаты терапевтического отделения в изолятор

23. Выберите комплекс противоэпидемических мероприятий,

направленных на I-е звено эпидемического процесса:

- а) выявление источников, их регистрация, госпитализация (изоляция);
- б) дезинфекция, дезинсекция, дератизация;
- в) мед.наблюдение, лаб. обследование, иммунопрофилактика.
- г) регистрация контактных, медицинское наблюдение, иммунопрофилактика;

24. Назначает текущую дезинфекцию в квартире больного дизентерией, оставленного дома:

- а) участковый эпидемиолог
- б) участковый терапевт;
- в) санитарный врач;
- г) врач дезинфекционной станции;

25. Выберите утверждение, не относящееся к механическому методу дезинфекции:

- а) сжигание,
- б) проветривание,-
- в) выхлопывание,
- г) фильтрация.

26. Укажите приемы физического метода при текущей дезинфекции в квартире больного острой кишечной инфекцией:

- а) сжигание,
- б) проветривание,
- в) кипячение,
- г) прокаливание.

27. Укажите не правильное утверждение. Химические дезинфекционные средства должны:

- а) быстро и полностью растворяться в воде,
- б) хорошо смешиваться с водой, образуя нестойкие эмульсии,
- в) быть стойкими при хранении,
- г) не оказывать аллергического действия на людей.

28. К химическим дезинфекционным средствам не относятся:

- а) щелочи,
- б) спирты,
- в) хлорактивные соединения,
- г) ультрафиолетовые лучи.

29. Укажите где следует хранить хлорсодержащие вещества

- а) на свету;
- б) в хорошо отапливаемом помещении;
- в) в прохладном помещении, закрытой таре
- г) в открытой таре;

30. Хлорсодержащие вещества следует хранить:

- а) в темноте;
- б) в хорошо отапливаемом помещении;
- в) в растворенном виде;
- г) в открытой таре;

31. Сухую хлорную известь используют для обработки:

- а) рвотных масс;
- б) посуды;
- в) личных вещей больного
- г) жилых помещений.

32. Укажите оптимальный срок сохранения активности 1% раствора хлорной извести:

- а) в течение 1 ч после приготовления;
- б) в течение рабочего дня;
- в) до 5 дней;
- г) в течение 1 мес.

33. Фенол используется для профилактической дезинфекции в эпидемических очагах :

- а) хирургических стационаров;
- б) родильных отделений;
- в) противотуберкулезных диспансерах.
- г) бассейнах, банях;

34. Рабочие растворы хлора не имеют побочное действие:

- а) имеют стойкий неприятный запах, раздражают дыхательные пути;
- б) оставляют пятна на тканях;
- в) вызывают коррозию металла;
- г) портят полированные и лакированные поверхности;

35. Обувь при грибковых заболеваниях кожи следует обрабатывать:

- а) в паровой камере;
- б) в пароформалиновой камере;
- в) перекисью водорода;
- г) раствором хлорамина;

36. Укажите раствор не используемое для дезинфекции:

- а) 1 % раствор хлорамина, приготовлен 2 дня назад;
- б) 0,5% раствор хлорной извести, приготовлен в день обработки;
- в) 10% раствор хлорной извести, приготовлен 4 дня назад;
- г) 3% раствор фенола, приготовлен 2 нед назад.

37. Укажите, кто инструктирует персонал в больнице:

- а) врач-ординатор;
- б) главный врач;
- в) старшая медицинская сестра;
- г) заведующий отделением;

38. В профильных отделениях для больных гнойными хирургическими заболеваниями в приемном отделении после осмотра больного руки персонала не следует обрабатывать:

- а) 70% этиловым спиртом;
- б) 0,5% раствором хлоргексидинабиглюконата в 70% этиловом спирте;
- в) 0,5% раствором хлорамина;
- г) 2% раствором хлорамина;

39. Укажите препараты, обладающие не только инсектицидным, но и овицидным действием:

- а) пиретрум;
- б) лизол;
- в) карбофос;
- г) формальдегид;

40. При осмотре в приемном покое больного, поступающего в терапевтическое отделение, обнаружены головные вши и гниды. Укажите неправильное действие о проведении обработки головы, белья и одежды больного

- а) обработать волосы мыльно-керосиновой эмульсией;
- б) обработать голову инсектицидными мылами;
- в) замочить белье в растворе хлорамина;
- г) отправить одежду для камерной обработки;

41. Назовите способ, который не применяется в борьбе с грызунами:

- а) механический;
- б) физический;
- в) химический;
- г) биологический;

42. Выберите комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на II-е звено эпидемического процесса:

- а) регистрация контактов, медицинское наблюдение, иммунопрофилактика;
- б) дезинфекция, дезинсекция, дератизация;
- в) мед. наблюдение, лаб. обследование, иммунопрофилактика.
- г) выявление источников, их регистрация, госпитализация (изоляция);

43. Кем назначается текущая дезинфекция в квартире больного дизентерией, оставленного дома:

- а) участковый педиатр;
- б) участковый эпидемиолог;
- в) санитарный врач;
- г) врач дезинфекционной станции;

44. Кем назначается текущая дезинфекция в квартире больного дизентерией, оставленного дома:

- а) врач-инфекционист;
- б) участковый эпидемиолог;
- в) санитарный врач;
- г) участковый терапевт.

45. Выберите утверждение, не относящееся к физическому методу дезинфекции:

- а) ультразвук,
- б) обработка горячим воздухом,
- в) радиоактивное излучение,

г) влажная уборка;

46. Укажите не правильное утверждение. Химические дезинфекционные средства должны:

- а) полностью растворяться в воде,
- б) обеспечивать дезинфицирующий эффект при низких концентрациях,
- в) обеспечивать дезинфицирующий эффект в короткие сроки,
- г) не вызывать порчу обрабатываемых предметов;

47. Назовите вещество, не относящееся к фенолам и его производным:

- а) формалин,
- б) фенол,
- в) лизол
- г) карболовая кислота;

48. Хлорсодержащие вещества следует хранить:

- а) в закрытой таре, на свету
- б) в открытой таре на свету;
- в) в открытой таре в темноте;
- г) в закрытой таре, в темноте, хорошо вентилируемом помещении;

49. Выберите хлорсодержащий препарат, наименее приемлемый для обработки жилых помещений:

- а) гипохлорит кальция;
- б) хлорная известь;
- в) хлорамин;
- г) дихлоргидантоин;

50. Хлорноизвестковое молоко используют для:

- а) дезинфекции жилых помещений;
- б) дезинфекции посуды;
- в) обработки туалетов в жилых помещениях;
- г) побелки и обработки выгребных уборных;

51. Укажите оптимальный срок сохранения активности 10% раствора хлорной извести:

- а) в течение 1 ч после приготовления;
- б) в течение рабочего дня;
- в) 5 дней;
- г) до 15 дней;

52. Для дезинфекции фенол не используется в виде:

- а) сухого вещества;
- б) водных растворов при комнатной температуре;
- в) мыльно-феноловых смесей при комнатной температуре;
- г) подогретых растворов;

53. Осветленные растворы 10-20% хлорной извести не имеют побочное действие:

- а) имеют стойкий неприятный запах, раздражают дыхательные пути;
- б) оставляют пятна на тканях;
- в) вызывают коррозию металла;
- г) помутнение стеклянной посуды.

54. Обувь при грибковых заболеваниях кожи следует обрабатывать:

- а) в паровой камере;
- б) в сушовой воздушной горячей камере;
- в) раствором формалина;
- г) раствором хлорамина;

55. Укажите для чего применяют паровые камеры :

- а) для дезинфекции,
- б) для дезинсекции.
- в) для дератизации;
- г) для дезинфекции, дератизации;

56. Ответственность за организацию и проведения комплекса противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в ЛПУ возлагается на:

- а) главного врача ЛПУ ;
- б) дезинфекционного отдела ГСЭН;
- в) врача эпидемиолога
- г) санитарного врача .

57. Укажите, кто контролирует выполнение режима в больнице:

- а) врач-ординатор;

- б) главный врач;
- в) старшая медицинская сестра;
- г) главную медицинскую сестру;

58. Выберите неправильное утверждение способа обработки посуды в пищеблоке больницы:

- а) освободить от остатков пищи;
- б) вымыть моющими растворами и замочить в растворе фенола;
- в) вымыть в проточной воде после дезинфектантов;
- г) вымыть моющими растворами;

59. Укажите препараты, обладающие не только инсектицидным, но и овицидным действием:

- а) пиретрум;
- б) лизол;
- в) гексахлоран;
- г) перекись водорода;

60. Укажите методы не использующие для уничтожения платяных вшей :

- а) химический;
- б) физический;
- в) биологический;
- г) механический;

61. В ЛПУ используют методы дератизации :

- а) химический;
- б) механический;
- в) биологический;
- г) физический;

62. Укажите, в каком случае имеются показания для проведения профилактической дезинфекции:

- а) общежитие, из которого госпитализирован больной дизентерией;
- б) терапевтическое отделение, из которого больной брюшным тифом (госпитализирован с диагнозом лпневмония+) переведен в инфекционную больницу;
- в) казарма, в которой предстоит разместить воинскую часть,
- г) детский сад, где выявлен больной вирусным гепатитом А;

63. Выберите утверждение, не относящееся к физическому методу дезинфекции:

- а) сжигание,
- б) проветривание,
- в) кипячение,
- г) прокаливание.

64. Укажите утверждение не относящееся к химическим дезинфекционным средствам:

- а) окислители,
- б) паровые камеры,
- в) хлорактивные соединения,
- г) фенолы и их производные;

65. Выберите препарат, содержащий 30-35% активного хлора:

- а) хлорная известь;
- б) монохлорамин;
- в) сульфохлорантин;
- г) дихлоргидантоин;

66. Укажите какое утверждение неверно при приготовлении 10% осветленного раствора хлорной извести:

- а) добавить воду к сухой хлорной извести;
- б) сухую хлорную известь высыпать в воду;
- в) полученную взвесь настоять 24 часа.
- г) полученное хлорно-известковое молоко профильтровать;

67. Укажите что для обработки плохо проветриваемого помещения следует использовать:

- а) 10% раствор хлорной извести;
- б) хлорамин;
- в) перекись водорода;
- г) лизол.

68. Не следует использовать для обработки в очаге туберкулеза:

- а) хлорамин;
- б) фенол;

- в) дихлордиметилгидантоин;
- г) раствор хлорной извести.

69. Укажите что проводят в приемном покое лечебно-профилактических учреждений всеобщим при поступлении :

- а) осмотр на педикулез;
- б) ректороманоскопию.
- в) флюорография;
- г) биохимический анализ крови;

70. Укажите в какую камеру следует направить для дезинфекции постельные принадлежности родильниц в родильном доме:

- а) паровую;
- б) формалиновую;
- в) сухожаровую;
- г) горячевоздушную.

71. Инфекции Укажите неправильное утверждение.

Сыпь является характерным симптомом следующих болезней:

- а) гриппа
- б) скарлатины
- в) кори
- г) брюшного тифа

72. Укажите неправильное утверждение.

Гепатолуэнальный синдром характерен для следующей инфекции:

- а) лептоспироз
- б) инфекционный мононуклеоз
- в) сыпной тиф
- г) грипп

73. Укажите антитоксические сыворотки применяемые для лечения:

- а) менингококковой инфекции
- б) рожи
- в) сыпного тифа
- г) ботулизма

74. Укажите сыпь характерной для брюшного тифа:

- а) уртикарная
- б) розеолезная
- в) петехиальная
- г) везикулярная

74. Укажите неправильное утверждение.

Для холеры характерны следующие проявления:

- а) обильный водянистый стул
- б) судороги
- в) схваткообразные боли в эпигастрии
- г) гипотермия

75. Укажите заболевание которое характерным осложнением является острый аппендицит:

- а) брюшной тиф
- б) дизентерия
- в) неспецифического язвенного колита
- г) псевдотуберкулез

76. Укажите для вирусного гепатита С характерны :

- а) острое циклическое течение болезни
- б) преобладание бессимптомной инфекции
- в) парентеральный путь заражения
- г) легкое течение болезни

77. Укажите характерный симптом бруцеллеза:

- а) высокая лихорадка
- б) ознобы
- в) потливость
- г) выраженная интоксикация

78. Укажите препаратом выбора для лечения лептоспироза является:

- а) эритромицин
- б) стрептомицин
- в) пенициллин
- г) левомицетин

79. Укажите неправильное утверждение. Менингококковая инфекция может протекать в следующих клинических формах:

- а) назофарингит
- б) ларинготрахеит
- в) менингит
- г) менингококкцемия

80. Укажите неправильное утверждение.

Для лабораторной диагностики инфекционного мононуклеоза применяют следующие методы:

- а) реакция Гоффа-Бауэра
- б) реакция Пауля-Буннеля
- в) общий анализ крови
- г) бактериологический анализ крови

81. Укажите для диагностики сыпного тифа используют:

- а) реакцию связывания комплемента
- б) выделение гемокультуры возбудителя
- в) реакцию Видаля
- г) реакцию Райта

82. Укажите что является возбудителем геморрагической лихорадки с почечным синдромом:

- а) простейшие
- б) бактерии
- в) риккетсия
- г) вирус

83. Укажите неправильное утверждение. Для первичной рожи характерны следующие симптомы:

- а) острое начало болезни
- б) наличие участка гиперемии кожи с нечеткими границами
- в) выраженная интоксикация
- г) лимфаденит

84. Укажите неправильное утверждение.

Для сибирязязвенного карбункула характерны:

- а) отсутствие гиперемии кожи
- б) выраженный отек мягких тканей
- в) локальная болезненность
- г) наличие черного струпа в центре карбункула

85. Укажите неправильное утверждение.

Для инфекционного мононуклеоза характерно:

- а) лихорадка
- б) тонзиллит
- в) полиаденопатия
- г) печеночная недостаточность

86. Укажите неправильное утверждение.

Характерными проявлениями сыпного тифа являются:

- а) острое начало болезни
- б) розеолезно-петехиальная сыпь
- в) полиаденит
- г) головная боль

87. Укажите для купирования малярийного приступа применяют:

- а) хиноцид
- б) хингамин
- в) примахин
- г) пириметамин

88. Укажите наиболее характерным симптомом туляремии является:

- а) сыпь
- б) лимфаденит
- в) полиартрит
- г) ринит

89. Укажите неправильное утверждение.

Для периода первичных клинических проявлений ВИЧ-инфекции характерны:

- а) лихорадка
- б) полиаденит
- в) диарея

г) кандидоз слизистых оболочек ротоглотки

90. Укажите неправильное утверждение.

Факторами, способствующими хронизации, являются:

- а) хроническая пневмония
- б) венозная недостаточность
- в) эпидермофития стоп
- г) сахарный диабет

91. Назовите препаратом выбора для лечения риккетсиозов являются:

- а) аминогликозиды
- б) сульфаниламиды
- в) тетрациклины
- г) рифампицин

92. Укажите для какого заболевания характерно наличие лимфаденита:

- а) сибирской язвы
- б) клещевого энцефалита
- в) сыпного тифа
- г) орнитоза

93. Укажите для лечения какого заболевания используется пенициллин:

- а) гриппа
- б) брюшного тифа
- в) дизентерии
- г) лептоспироза

94. Укажите осложнение брюшного тифа:

- а) миокардит
- б) пиелит
- в) паротит
- г) кишечное кровотечение

95. Укажите характерный стул для дизентерии:

- а) жидкий каловый без слизи
- б) каловый со слизью, пропитанной кровью
- в) скудный, бескаловый, слизисто-кровянистый
- г) обильный, водянистый, цвета болотной тины

96. Укажите неправильное утверждение. При установке диагноза ПТИ показаны:

- а) экстренная госпитализация больного
- б) назначение тетрациклина
- в) промывание желудка
- г) внутривенная инфузионная терапия

97. Укажите неправильное утверждение.

Для генерализованной формы иерсиниоза наиболее характерны:

- а) высокая лихорадка
- б) гепато-лиенальный синдром
- в) полиаденит
- г) везикулезная сыпь

98. Укажите неправильное утверждение. Для вирусного гепатита D характерно:

- а) сочетание с вирусным гепатитом В
- б) гепато-лиенальный синдром
- в) выраженная лихорадочная реакция
- г) развитие острой печеночной недостаточности

99. Укажите неправильное утверждение.

Для диагностики бруцеллеза используют следующие лабораторные тесты:

- а) реакцию Райта
- б) реакцию Хеддлсона
- в) реакцию Видаля
- г) реакцию Кумбса

100. Укажите неправильное утверждение. Для гриппа характерны:

- а) насморк
- б) инъекция конъюнктив
- в) лихорадка
- г) диспептический синдром

101. Укажите неправильное утверждение.

Лихорадка является характерным симптомом следующих инфекционных болезней:

- а) брюшной тиф
- б) холера
- в) сальмонеллез
- г) лептоспироз

102. Укажите для лечения какого заболевания применяется Левомецитин:

- а) пищевых токсикоинфекций
- б) амебиаза
- в) гриппа
- г) брюшного тифа

103. Укажите инфекционную болезнь которому свойственен полиаденит:

- а) сепсису
- б) столбняку
- в) бешенству
- г) ВИЧ-инфекции

104. Укажите с чем выделяется возбудитель брюшного тифа в окружающую среду:

- а) со слюной и мочой
- б) со слюной и фекалиями
- в) с фекалиями и мокротой
- г) с фекалиями и мочой

105. Укажите информативный метод диагностики дизентерии:

- а) бактериологическое исследование кала
- б) ректороманоскопия
- в) бактериологическое исследование крови
- г) реакция пассивной гемагглютинации

106. Укажите что характерно для гастроинтестинальной формы сальмонеллеза:

- а) интоксикация
- б) лихорадка в течение 7-10 дней
- в) острый гастроэнтерит
- г) обезвоживание

107. Укажите что для вирусного гепатита не А характерно:

- а) острое начало
- б) гриппоподобный синдром в преджелтушном периоде
- в) улучшение состояния при переходе в желтушный период
- г) хронизация гепатита

108. Укажите что характерно для вирусного гепатита Е

- а) водный путь заражения
- б) парентеральный путь заражения
- в) боли в правом подреберье
- г) среднетяжелое течение болезни

109. Укажите антибиотики которые используются для лечения бруцеллеза :

- а) стрептомицин
- б) левомецитин
- в) тетрацилин
- г) пенициллин

110. Укажите неправильное утверждение. Для гриппа характерны:

- а) сыпь
- б) ломота в мышцах
- в) головная боль
- г) лихорадка

111. Укажите каким инфекционным болезням свойственен полиаденит:

- а) инфекционный мононуклеоз
- б) ВИЧ-инфекция
- в) менингококковая инфекция
- г) бруцеллез

112. Укажите для лечения какого заболевания применяется тетрациклины:

- а) столбняка
- б) брюшного тифа
- в) геморрагических лихорадок

113. Укажите продолжительность инкубационного периода брюшного тифа:

- а) 1-3 дня
- б) 7-14 дней
- в) 14-28 дней
- г) 7-25 дней

114. Укажите с чем проводят регидратационную терапию при холере с обезвоживанием 3-й ст.:

- а) гемодезом
- б) полиионными растворами со скоростью 120 кап/мин
- в) 10% -ным раствором глюкозы
- г) полиионными растворами со скоростью 100 мл/мин

115. Укажите неправильное утверждение. Для вирусного гепатита В характерны:

- а) диспептические расстройства в преджелтушном периоде
- б) ухудшение состояния при переходе в желтушный период
- в) улучшение состояния больного с появлением желтухи
- г) выраженный холестатический синдром

116. Укажите неправильное утверждение.

Характерным симптомом ботулизма является:

- а) двоение в глазах
- б) поперхивание пищей
- в) лихорадка
- г) чувство нехватки воздуха

117. Укажите неправильное утверждение.

Источником инфекции при бруцеллезе могут быть:

- а) овцы
- б) козы
- в) больной человек
- г) коровы

118. Укажите неправильное утверждение.

Для успешного лечения гриппа необходимо как можно раньше назначать:

- а) ремантадин
- б) бисептол
- в) тепловые процедуры
- г) противогриппозный иммуноглобулин

119. Укажите возбудитель сыпного тифа:

- а) спирохета
- б) сальмонелла тифимуриум
- в) микоплазма
- г) риккетсия

120. Менингококковая инфекция характеризуется:

- а) острым началом болезни
- б) гипертермией
- в) ознобом
- г) гепатоспленомегалией

121. Укажите что характерно для орнитоза:

- а) контакт с больной собакой
- б) контакт с больной птицей
- в) лихорадка
- г) пневмония

122. Укажите симптомы геморрагической лихорадки с почечным синдромом:

- а) гиперемия и одутловатость лица
- б) высокая лихорадка
- в) желтуха
- г) геморрагический синдром

123. Укажите что характерны для СПИДа:

- а) кандидозный эзофагит
- б) генерализованная саркома Капоши
- в) кахексия
- г) лимфаденит

124. Укажите какие симптомы характерны для тропической малярии:

- а) озноб
- б) лихорадка неправильного типа
- в) гепато-лиенальный синдром

г) розеолезно-папулезная сыпь

125. Острая фаза гельминтозов характеризуется:

- а) симптомами, обусловленными локализацией паразита в организме
- б) лихорадкой
- в) зудящими высыпаниями на коже
- г) токсико-аллергическим поражением сердца и печени

126. Укажите неправильное утверждение:

- а) возбудителем ВИЧ-инфекции является вирус
- б) основной путь передачи ВИЧ-инфекции половой
- в) заражение ВИЧ может происходить при бытовом контакте
- г) клиническая картина СПИДа не отличается от клинической картины других приобретенных иммунодефицитов

127. Укажите что характерно для лептоспироза:

- а) озноб
- б) полиаденит
- в) высокая лихорадка
- г) гепато-лиенальный синдром

128. Назовите симптомы сепсиса:

- а) диарея
- б) лихорадка
- в) озноб
- г) гепато-лиенальный синдром

129. Лихорадка является характерным симптомом следующих инфекционных болезней:

- а) туляремии
- б) дифтерии
- в) ботулизма
- г) сыпного тифа

130. Укажите для профилактики и лечения чего применяется специфический иммуноглобулин:

- а) бруцеллеза
- б) псевдотуберкулеза
- в) амебиаза
- г) бешенства

131. Укажите для лечения какого заболевания применяется антитоксические сыворотки:

- а) эхинококкоза
- б) инфекционного мононуклеоза
- в) лептоспироза
- г) дифтерии

132. Укажите поражение чего происходит при брюшном тифе:

- а) печени и селезенки
- б) легких
- в) лимфатического аппарата тонкой кишки
- г) ЦНС

133. Укажите для какого заболевания характерна лихорадка постоянного типа:

- а) для бруцеллеза
- б) для иерсиниоза
- в) для туляремии
- г) для брюшного тифа

134. Гепатолиенальный синдром является типичным проявлением:

- а) брюшного тифа
- б) сибирской язвы
- в) паротита
- г) дизентерии

135. Укажите для какой болезни пенициллин является препаратом выбора:

- а) холеры
- б) рожи
- в) трихинеллеза
- г) бруцеллеза

136. Эритромицин является препаратом выбора для лечения:

- а) орнитоза
- б) брюшного тифа
- в) легионеллеза
- г) дифтерии

137. Антитоксические сыворотки применяются для лечения:

- а) сальмонеллеза
- б) столбняка
- в) вирусных гепатитов
- г) холеры

138. Укажите для какой болезни характерен изнуряющий тип лихорадки:

- а) для сепсиса
- б) для геморрагических лихорадок
- в) для лептоспироза
- г) для инфекционного мононуклеоза

139. Сыпь является характерным клиническим симптомом:

- а) дифтерии
- б) столбняка
- в) малярии
- г) скарлатины

140. Укажите для какой болезни характерно наличие лимфаденита:

- а) для менингококковой инфекции
- б) для вирусного гепатита С
- в) для столбняка
- г) для рожи

141. Полиаденит свойственен следующим инфекционным болезням:

- а) бруцеллезу
- б) гриппу
- в) ботулизму
- г) дифтерии

142. Укажите для чего характерна специфическая пневмония:

- а) сыпного тифа
- б) малярии
- в) орнитоза
- г) сальмонеллеза

143. Лихорадка длительностью более 5 дней характерна для:

- а) дизентерии
- б) брюшного тифа
- в) краснухи
- г) вирусного гепатита

144. Сыпь является характерным клиническим проявлением:

- а) амебиаза
- б) бруцеллеза
- в) кори
- г) дизентерии

145. Укажите для какого заболевания характерно наличие лимфаденита:

- а) вирусного гепатита С
- б) амебиаза
- в) холера
- г) туляремии

146. Укажите неправильное утверждение. Гепато-лиенальный синдром характерен для следующих инфекционных болезней:

- а) лептоспироз
- б) инфекционный мононуклеоз
- в) сыпной тиф
- г) грипп

147. Укажите неправильное утверждение в отношении сепсиса:

- а) вызывается условно-патогенной флорой
- б) характерно наличие входных ворот инфекции
- в) характерен полиморфизм клинической симптоматики
- г) течение болезни циклическое

148. Укажите неправильное утверждение. Лихорадка характерна для:

- а) холеры
- б) дифтерии
- в) туляремии
- г) сыпного тифа

149. При брюшном тифе:

- а) продолжительность лихорадки не превышает 7 дней
- б) часто наблюдается стул со слизью и кровью
- в) наиболее ярким симптомом является длительная лихорадка
- г) при ректороманоскопии обнаруживаются язвы

150. При дифтерии:

- а) главным звеном патогенеза является бактериемия
- б) характерным является наличие гепато-лиенального синдрома
- в) в основе патогенеза лежит действие токсина
- г) характерно наличие обширных гнойных налетов на слизистой ротоглотки

151. При дифтерии ротоглотки:

- а) подчелюстные лимфоузлы резко болезненны и спаяны с окружающими тканями
- б) характерно наличие фибриновых налетов на миндалинах, переходящих на дужки и нёбо
- в) при объективном осмотре ротоглотки "пылающий зев"
- г) наблюдается болезненность и затруднение открывания рта

152. Укажите неправильное утверждение. При токсической дифтерии зева:

- а) характерным осложнением является токсический гепатит
- б) основная причина смерти - поражение миокарда
- в) токсическая полинейропатия может развиваться через 6-8 недель от начала болезни
- г) наблюдается отек шейной клетчатки, распространяющийся на грудную клетку

153. Укажите неправильное утверждение. При дифтерии:

- а) возможно развитие асфиксии
- б) характерна язвенно-некротическая ангина
- в) часто поражаются дыхательные пути
- г) дифференциальный диагноз проводят со скарлатиной

154. При дифтерии:

- а) лечение следует начинать с антибиотикотерапии
- б) противодифтерийную сыворотку следует вводить до полного отторжения налетов
- в) применение сердечных гликозидов показано при развитии миокардита
- г) основу лечения составляет введение противодифтерийной сыворотки

155. Укажите инфекционное заболевание которое проявляется синдромом желтухи:

- а) сыпной тиф
- б) иерсиниоз
- в) лептоспироз
- г) инфекционный мононуклеоз

156. Укажите для какого заболевания характерно диарея:

- а) дизентерии
- б) сальмонеллеза
- в) ботулизма
- г) амебиаза

157. Миокардит является частым осложнением следующих болезней:

- а) дифтерии
- б) энтеровирусной инфекции
- в) скарлатины
- г) вирусных гепатитов

158. К кишечным гельминтозам относится:

- а) фасциолез
- б) аскаридоз
- в) описторхоз
- г) эхинококкоз

159. При острых респираторных заболеваниях:

- а) в отличие от гриппа, отсутствует интоксикационный синдром
- б) поражаются слизистые оболочки верхних дыхательных путей и ротоглотки
- в) возможно развитие крупа
- г) в ранние сроки болезни следует назначать антибиотики

160. При гриппе:

- а) наиболее ранним симптомом является першение в горле и явления ринита
- б) наблюдается токсическое поражение ЦНС
- в) лихорадка обычно не превышает 3-5 дней

г) никогда не наблюдается сыпи

161. Укажите неправильное утверждение:

- а) геморрагическая лихорадка встречается в Московской области
- б) при геморрагических лихорадках часто поражаются почки
- в) геморрагические лихорадки являются только болезнями стран с тропическим и субтропическим климатом
- г) при геморрагических лихорадках геморрагические проявления развиваются на фоне лихорадки и интоксикации.

162. Укажите симптомы сыпного тифа:

- а) острое начало болезни
- б) менингеальный синдром
- в) увеличение селезенки
- г) обильная пятнисто-папулезная сыпь

163. При столбняке:

- а) самым ранним симптомом является тризм жевательных мышц лица
- б) после перенесенной болезни развивается стойкий иммунитет
- в) развитие болезни обусловлено действием столбнячного токсина
- г) гипертермия является прогностически неблагоприятным симптомом

164. Укажите неправильное утверждение. При бешенстве:

- а) заражение возможно при попадании слюны больного животного на кожу
- б) наиболее ярким симптомом болезни является гидрофобия
- в) вакцинация является наиболее надежным средством профилактики
- г) возможно полное излечение при своевременно начатом лечении

165. Укажите неправильное утверждение. При чуме:

- а) заражение происходит только трансмиссивным путем
- б) характерна резко выраженная общая интоксикация
- в) самый частый симптом лимфаденит (бубон)
- г) наибольшую эпидемическую опасность представляет легочная форма болезни

166. Укажите опасное осложнение инфекционных болезней:

- а) инфекционно-токсический шок
- б) гиповолемический шок
- в) отек мозга
- г) анафилактический шок

167. Укажите симптомы, не характерные для холеры:

- а) рвота
- б) боли в желудке
- в) стул обильный светлый без запаха
- г) нормальная температура

168. Генерализованную форму иерсиниоза отличают от локализованной:

- а) рвота
- б) увеличение печени и селезенки
- в) боли в правой подвздошной области
- г) диарея

169. Укажите характерные проявления продромального периода вирусного гепатита А:

- а) гриппоподобный, диспептический
- б) астеновегетативный, миалгический
- в) диспептический, астеновегетативный
- г) артралгический, диспептический

170. Укажите основную причину абдоминальных осложнений брюшного тифа:

- а) кишечное кровотечение
- б) перитонит
- в) токсико-инфекционный шок
- г) язвенный процесс в кишечнике

171. При вирусных гепатитах укажите биохимические тесты, отражающие холестаз:

- а) АЛТ
- б) АСТ
- в) щелочная фосфатаза
- г) тимоловая проба

172. Тяжесть течения болезни при холере обуславливает:

- а) интоксикация
- б) изотоническая дегидратация
- в) инвазия возбудителя в слизистую кишечника

г) гипертермический синдром

172. Укажите что характерны для острого периода амебиаза кишечника:

- а) рвота
- б) боли по ходу толстого кишечника, преимущественно справа
- в) боли в эпигастрии
- +г) жидкий стул с обильной примесью слизи, окрашенной кровью "малиновое желе"

173. Укажите неправильное утверждение: наиболее информативными симптомами лептоспироза являются:

- а) интоксикация
- б) увеличение лимфоузлов
- в) интенсивная миалгия
- г) геморрагии на коже

174. Перфорация кишечника при брюшном тифе соответствует:

- а) периоду мозговидного набухания пейеровых бляшек и солитарных фолликулов
- б) периоду некроза
- в) периоду образования корок
- г) периоду чистых язв

175. Наиболее нехарактерные типы температурных кривых при брюшном тифе:

- а) трапециевидная Вундерлиха
- б) волнообразная Боткина
- в) субфебрильная
- г) перемежающаяся

176. Укажите неправильное утверждение. Клинические признаки декомпенсированного обезвоживания:

- а) гипотермия
- б) генерализованные судороги
- в) повышение АД
- г) нитевидный пульс

177. Укажите неправильное утверждение. Синдромами, характерными для иерсиниоза являются:

- а) гастроинтестинальный
- б) аллергический
- в) неврологический
- г) артралгический

178. Укажите основные синдромы ботулизма:

- а) миастенический
- б) менингеальный
- в) гастроинтестинальный
- г) псевдопаралитический

179. Укажите неправильное утверждение. Клиническими симптомами острой печеночной недостаточности являются:

- а) увеличение печени
- б) тахикардия
- в) сокращение размеров печени
- г) энцефалопатия

180. Укажите антибактериальные препараты для лечения генерализованной формы сальмонеллеза:

- а) фуразалидон
- б) оксациллин
- в) пенициллин
- г) левомецитин

181. Укажите неправильное утверждение. Характерные изменения периферической крови при брюшном тифе:

- а) лейкопения
- б) лейкоцитоз
- в) относительный лимфоцитоз
- г) анэозинофилия

182. Укажите характерные симптомы для энтеробиоза:

- а) зуд и жжение в области ануса, раздражительность
- б) боль в правом подреберье
- в) лихорадка
- г) боли в эпигастрии

183. Укажите неправильное утверждение. Для начального периода

лептоспироза характерны:

- а) высокая температура
- б) миалгия
- в) схваткообразные боли в животе
- г) гиперемия лица

184. Информативный биохимический тест в продромальном периоде вирусного гепатита А:

- а) общий билирубин
- б) белковые фракции крови
- в) ферменты АЛТ, АСТ
- г) щелочная фосфатаза

185. Возбудителя холеры можно обнаружить:

- а) в крови
- б) в моче
- в) в ликворе
- г) в рвотных массах

186. Укажите что нехарактерно для брюшного тифа:

- а) бледность кожных покровов
- б) розеолезная экзантема
- в) гепатоспленомегалия
- г) тахикардия

187. При декомпенсированном обезвоживании при холере наблюдается:

- а) увеличение ОЦК
- б) метаболический декомпенсированный ацидоз
- в) гипокалемия
- г) гипоксия тканевая

188. Укажите клинические симптомы

ботулизма:

- а) двоение, "сетка", "туман" перед глазами
- б) боли в ногах
- в) нарушение речи
- г) частый, скудный стул

189. Укажите кардиальные симптомы трихинеллеза:

- а) кашель
- б) лихорадка
- в) отеки век и лица
- г) миалгия

190. Укажите основной патогенетический механизм, обуславливающий диарею при холере:

- а) воспаление слизистой оболочки кишечника
- б) проникновение вибриона в энтероциты
- в) активация холерогеном аденилатциклазы энтероцитов
- г) нарушение всасывания жидкости

191. Первичной локализацией патологического процесса в кишечнике при амебиазе является:

- а) слепая и восходящая кишка
- б) поперечно-ободочная кишка
- в) прямая кишка
- г) сигмовидная кишка

192. Для гастроэнтероколитической формы дизентерии не характерны:

- а) тошнота, рвота
- б) схваткообразные боли в правой подвздошной области
- в) схваткообразные боли в животе, диффузные
- г) жидкий обильный стул без патологических примесей

193. При брюшном тифе появление сыпи характерны в следующие сроки:

- а) 1-3-й день болезни
- б) 4-7-й день болезни
- в) 8-10-й день болезни
- г) после 14-го дня болезни

194. Для вирусного гепатита типично повышение общего билирубина:

- а) только за счет связанной фракции
- б) только за счет свободной фракции
- в) преимущественно за счет связанной фракции
- г) преимущественно за счет свободной фракции

195. Укажите неправильное утверждение. При лечении иерсиниоза используются:

- а) пенициллин
- б) тетрациклин
- в) гентамицин
- г) левомицетин

196. Укажите причину цитолиза гепатоцитов при вирусном гепатите В:

- а) непосредственное действие вируса на гепатоциты
- б) иммунный ответ на вирусные антигены и клеточные аутоантигены
- в) внутрипеченочный холестаз
- г) активация фиброцитов

197. Укажите клинические варианты дизентерии, при которых наиболее выражено обезвоживание:

- а) колитическая
- б) гастроэнтероколитическая
- в) энтероколитическая
- г) гастритическая

198. При диагностики возбудителя брюшного тифа не исследуют:

- а) кровь
- б) рвотные массы
- в) моча
- г) кал

199. Укажите, какой наиболее характерный стул при кишечной форме амёбиоза:

- а) обильный, водянистый без примесей
- б) скудный жидкий стул с примесями слизи и крови
- в) жидкий типа "малинового желе", зловонный
- г) обильный жидкий, с примесью "рубленого яйца", пенистый

200. Укажите неправильное утверждение. Наиболее частые симптомы характеризующие псевдотуберкулез:

- а) обильная мелкоочечная сыпь
- б) гиперемия кожи лица, шеи, ладоней
- в) лихорадка
- г) пневмония

201. Предметом изучения эпидемиологии является...

- 1. инфекционный процесс
- 2. возбудителей инфекционных заболеваний
- 3. закономерности эпидемического процесса
- 4. популяцию человека в целом
- 5. механизмы передачи возбудителей

201. Главной задачей эпидемиологии является изучение...

- 1. популяция человека
- 2. здоровье населения
- 3. заболеваемость инфекционными болезнями
- 4. заболеваемость любыми болезнями
- 5. заболеваемость неинфекционными болезнями

202. Под эпидемическим процессом понимают ...

- 1. процесс возникновения и распространения инфекционных болезней среди населения
- 2. взаимодействие возбудителя и восприимчивого организма, проявляющееся болезнью или носительством возбудителя инфекции
- 3. повышение уровня заболеваемости на ограниченной территории
- 4. взаимодействие популяций паразитов и людей, объединенных общей территорией, бытовыми, природными и другими условиями существования
- 5. возникновение заболевания у конкретного человека

203. Под "спорадической заболеваемостью" понимают заболевания...

- 1. единичные
- 2. групповые
- 3. массовые
- 4. характерные для данной местности
- 5. характерные в данный момент времени

204. Под эпидемическими инфекционными болезнями понимают...

- 1. болезни, несвойственные данной местности

2. болезни, постоянно существующие на данной территории
3. вирусные болезни, распространяемые членистоногими
4. массовые заболевания
5. единичные

205. Больные с какими формами представляют главную опасность...

1. типичными
2. тяжелыми
3. манифестными
4. легкими атипичными
5. бессимптомными

206. Вспышки реализующиеся пищевым путём передачи характеризуются...

1. возникновением заболеваний по цепочке
2. выраженной сезонностью
3. коротким инкубационным периодом у заразившегося
4. связью с водоемисточником
5. наличием переносчика

207. Передача внутриутробных инфекций осуществляется следующим механизмом...

1. трансмиссивный
2. вертикальный
3. аэрогенный
4. фекально-оральный
5. искусственный

208. При вертикальном механизме передачи возбудитель передается...

1. зараженной почвой
2. зараженными овощами
3. через пыль в жилище
4. от матери к плоду
5. через зараженный медицинский инструментарий

209. К профилактическим мероприятиям, направленным на первое звено эпидемического процесса относят...

1. выявление бактерионосителей
2. соблюдение личной гигиены
3. употребление доброкачественной воды
4. санитарно-просветительская работа
5. дезинфекционные мероприятия

210. К противоэпидемическим мероприятиям, направленным на второе звено эпидемического процесса относят...

1. выявление бактерионосителей
2. заключительная дезинфекция
3. иммунопрофилактика
4. госпитализация больных
5. санитарно-просветительская работа

211. Противоэпидемические мероприятия, направленные на третье звено эпидемического процесса...

1. текущая дезинфекция
2. соблюдение личной гигиены
3. изоляция больных
4. санитарно-просветительская работа
5. выявление бактерионосителей

212. В эпидемическом очаге в отношении источника инфекции выполняются следующие меры...

1. госпитализация больного
2. вакцинопрофилактика
3. уничтожение членистоногих
4. дезинфекция
5. санитарно-просветительская работа

213. Врач, выявивший инфекционную болезнь, должен...

- 1.определить границу очага
2. заполнить «экстренное извещение»
3. провести заключительную дезинфекцию
4. организовать мероприятия по ликвидации очага
5. выявить источник инфекции

214. Под вспышками инфекционных заболеваний понимают...

1. сезонный подъем заболеваемости
2. подъем заболеваемости через каждые 5 лет
3. микст – инфекции
4. подъёмы заболеваемости, возникающие вне ритмических колебаний
5. подъем заболеваемости через каждые 3 года

215. Эпидемический процесс поддерживается при наличии...

1. источника инфекции
2. механизма передачи
3. восприимчивого населения
4. обязательного сочетания всего перечисленного выше, регулируемое социальными и природными факторами
5. социальных факторов

216. Вертикальный механизм передачи имеет место...

1. при геморрагической лихорадке с почечным синдромом
2. при врождённом сифилисе
3. при брюшном тифе
4. при стафилококкозах
5. при сальмонеллезе

217. В инкубационном периоде больной представляет эпидемиологическую опасность ...

1. при брюшном тифе
2. при вирусном гепатите А
3. при сальмонеллезе
4. при иерсиниозе
5. при псевдотуберкулезе

218. Сезонные подъемы наблюдаются при...

1. абсолютно всех инфекционных заболеваниях
2. всех неинфекционных заболеваний
3. всех болезнях, независимо от их происхождения
4. большинстве инфекционных заболеваний
5. не характерны для инфекционных заболеваний

219. Выберите кислородсодержащий дезинфектант...

1. карболовая кислота
2. ДТСГК
3. дезоксон
4. сульфохлорантин
5. хлорамин.

220. Дезинфекции в паровой камере подлежат...

1. дубленки
2. кожаные пальто
3. вещи из синтетических тканей
4. подушки и матрацы
5. меховые изделия.

221. После госпитализации больного заключительная дезинфекция в очаге в пределах города проводится...

1. в пределах суток
2. через 12 часов
3. в пределах 6 часов
4. может не проводиться, в зависимости от санитарного состояния очага
5. в первые 3 часа

222. Концентрация спирта в качестве дезинфицирующего средства...

1. 50 %
2. 70 %
3. 96 %
4. 40 %
5. 60 %.

223. При грибковых заболеваниях обувь обрабатывают формалином в концентрации...

1. 25 %
2. 15 %
3. 10 %
4. 5 %
5. 40 %.

224. Пароформалиновые камеры используют для...

1. дезинсекции
2. дезинфекции
3. дегазации
4. дезактивации
5. дезинфекции и дезинсекции.

225. Концентрация формалина для обработки обуви при грибковых заболеваниях...

1. 25 %
2. 15 %
3. 10 %
4. 5 %
5. 2,5%

226. В очагах туберкулеза на дому текущая дезинфекция выполняется...

1. участковым медперсоналом противотуберкулезного учреждения
2. членом семьи, ухаживающим за больным
3. дезинфектором противотуберкулезного учреждения
4. дезинфектором дезстанции
5. дезинфектором профотдела санэпидстанции.

227. Препарат используемый для борьбы с педикулезом...

1. перекись водорода
2. неопин
3. ДТСГК
4. бура
5. дэта.

228. Переносчиков инфекционных болезней уничтожают путем проведения...

1. дезинсекции
2. дезинфекции
3. санитарно-гигиенических мероприятий
4. дератизации
5. изоляции больного.

229. Препараты для дезинсекции, относящиеся к кишечным ядам...

1. фторид натрия и борная кислота
2. дихлорэтан и ДТСКГ
3. борная кислота и хлорпикрин
4. карбофос и дихлорэтан
5. хлорпикрин и карбофос

230. Заболевания, возбудители которых являются свободноживущими в окружающей среде...

- 1) зооантропонозные
- 2) зоонозные
- 3) антропонозные
- 4) сапронозные
- 5) антропозооноз

231. Заболевание, при котором источником инфекции является только животное...

- 1) зооантропонозное
- 2) зоонозное

- 3) антропонозное
- 4) сапронозное
- 5) антропозооноз

232. Заболевание, при котором источником инфекции являются животные и человек...

- 1) зооантропонозное
- 2) зоонозное
- 3) антропонозное
- 4) сапронозное
- 5) антропосапроноз

233. Эпизоотический процесс - это...

- 1) процесс возникновения и распространения инфекционных болезней среди населения
- 2) распространение болезней только среди диких животных
- 3) взаимодействие возбудителя и восприимчивого организма, проявляющееся болезнью или носительством возбудителя инфекции
- 4) распространение болезней среди животных
- 5) распространение болезней среди людей и животных

234. Эпидемический процесс состоит из ...

- 1) трех различных возбудителей
- 2) трех взаимосвязанных звеньев
- 3) передач заболеваний от одного к другому
- 4) путей передачи
- 5) механизмов передачи

235. На какое звено эпидемического процесса преимущественно влияют природные факторы...

- 1) источник инфекции
- 2) пути и факторы передачи возбудителя
- 3) восприимчивость населения
- 4) источник инфекции и восприимчивость населения
- 5) на состояние иммунитета

236. Наибольшую опасность представляют больные с формами заболевания ...

- 1) типичными
- 2) тяжелыми
- 3) манифестными
- 4) легкими атипичными
- 5) среднетяжелыми

237. Какой фактор передачи возбудителя кишечных инфекций имеет наибольшее эпидемиологическое значение...

- 1) детские игрушки
- 2) овощи
- 3) фрукты
- 4) дверные ручки
- 5) столовые приборы

238. Механизм передачи зависит от...

- 1) формы заболевания
- 2) вида возбудителя
- 3) локализации возбудителя
- 4) особенностей организма
- 5) особенности возбудителя

239. Контактный-бытовой путь передачи возбудителей характеризуется...

- 1) возникновением заболеваний по цепочке
- 2) минимальным инкубационным периодом
- 3) преимущественным заболеванием взрослых лиц
- 4) связью с водоемисточником
- 5) максимальным инкубационным периодом

240. Водный тип вспышки характеризуется...

- 1) заболеванием детей до 1 года
- 2) возникновением заболеваний по цепочке

- 3) коротким инкубационным периодом у заразившегося
- 4) связью с водоемисточником
- 5) преимущественным заболеванием взрослых лиц

241. Пищевой тип вспышки характеризуется...

- 1) возникновением заболеваний по цепочке
- 2) выраженной сезонностью
- 3) коротким инкубационным периодом у заразившегося
- 4) связью с водоемисточником
- 5) преимущественным заболеванием взрослых лиц

242. По какому признаку заболеваемость рассматривается как вспышка, эпидемия, пандемия...

- 1) по скорости распространения инфекции
- 2) по тяжести течения болезни
- 3) по числу выявленных носителей
- 4) по количеству выявленных случаев
- 5) возникновением заболеваний по цепочке

243. Для пищевого типа вспышки характерно...

- 1) постепенное увеличение числа заболевших
- 2) все заболевания вызваны возбудителем одного серовара, фаговара, биовара
- 3) возникновением заболеваний по цепочке
- 4) максимальным инкубационным периодом у заразившихся
- 5) тяжесть течения болезни

244. Возможность передачи воздушно-пылевым путем определяется...

- 1) устойчивостью возбудителя во внешней среде
- 2) особенностями выделяемого больным патологического секрета
- 3) скоростью снижения вирулентности возбудителя во внешней среде
- 4) дисперсностью аэрозоля
- 5) инкубационным периодом заболевания

245. Искусственный механизм передачи возбудителя...

- 1) артифициальный
- 2) фекально-оральный
- 3) аэрогенный
- 4) трансмиссивный
- 5) трансплацентарный

246. Артифициальный путь передачи предполагает использование...

- 1) пищевых продуктов
- 2) воды
- 3) хирургических инструментов
- 4) инфицированных предметов обихода
- 5) средства личной гигиены

247. Механизм передачи внутриутробных инфекций...

- 1) трансмиссивный
- 2) вертикальный
- 3) аэрогенный
- 4) фекально-оральный
- 5) горизонтальный

248. «Экстренное извещение» заполняется по форме № ...

- 1) 63у
- 2) 60у
- 3) 58у
- 4) 5у
- 5) форма №2

249. «Экстренное извещение» заполняет врач...

- 1) заподозривший инфекционную болезнь
- 2) установивший границы эпидемического очага
- 3) после проведения дезинфекции в очаге
- 4) после лабораторного подтверждения диагноза у инфекционного больного

5) врач-эпидемиолог

250. «Экстренное извещение» заполняется...

- 1) после консультации с узкими специалистами
- 2) немедленно при подозрении на инфекционную болезнь
- 3) после лабораторного подтверждения диагноза
- 4) после проведения противоэпидемических мероприятий
- 5) после вакцинации контактных