

ТАБЛИЦА ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

№	ФИО ИНН пациента № истории болезни	ВОЗРАСТ (Годы)	ПОЛ	Название базы, где проводилс а прием	Место проживания	АНАМЕЗ ЗАБОЛЕВА НИЯ	ДИАГНОЗ	СОПУСТЬ УХОДИЕ ЗДОРОВЬЯ	МКБ-10 ДИАГНОЗ	ПРОВЕДЕН НОЕ ЛЕЧЕНИЕ	ВИД АНЕСТЕЗИ	ИСОЛЬЗУЕ МЬЕ МАТЕРИАЛ	ИНДЕКС КПУ	НАЛИЧИЕ ИЛЛЮГ-С^	ГУЛБРИТ. ПРИЧАС	ПРИМЕЧА НИЯ
1	Садырбек ов Данил	2020	МУЖ	ГСП № 1	Джим	сильная зубная боль, рис у образ ая или ос оя ая, усиливаю аяся о холод о о/оряче о, жева ия или адавлива ия, час о бес окоя ая очью, а акже о каз о еды, ка ризы	кариес 51	НЕТ	ООР55/КО4.0	ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ БОР МАШИНОЙ, НАЛАДЫВАНИЕ <i>arsen pasta</i> В ПОЛОСТЬ ПОД ДЕНТИН ПАСТОЙ НА 48ч МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ без анестезии безболезненно удаляем некротизированную пульпу. После удаления мертвой пульпы в полость зуба вкладывают тампон с резодент смесью (жидкостью), который в третье посещение заменяют на резодент пасту и сверху накладываем постоянную пломбу (цемион)	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ — ХЛОРГЕКСИДИН , <i>arsen pasta</i> , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА для ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , ЦЕМИОН-Ф	С- 64 65	Н ЕТ	Н ЕТ	

2	Айдарова Феруза	1988	жен	ГСП№ 1	Масалиева 14 36	Жалоб в основном нет, чаще выявляются при осмотре, плановой санации. Но иногда жалобы на наличие свищей, дискомфорт при приёме пищи (застревание пищи с раздражением десневого сосочка), может наблюдаться изменение в цвете зуба. Кариозная полость не глубокая, полость зуба чаще не вскрыта, цвет зуба от сероватого до коричневого, в некоторых случаях интенсивно изменён в цвете в области шейки и прикрыт налётом, что сразу не обнаруживается, на переходной складке м.б. обнаружены свищи, если свищей нет, то переходная складка синюшная, пастозная, парезная.	Пульпит 16	НЕТ	Pt-54/КО4.4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕНДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУСТВИИ ЖАЛОБ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕТ	для АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБР .ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН		НЕТ
3	Малумаров а Диля	1993	ЖЕН	ГСП№ 1	М Каленин 2 21	сильная зубная боль, <i>рис у образ ая или ос оя ая, усиливаю аяся о холод о о/оряче о, жева ия или адавлива ия, час о бес окоя ая очью, а акже о каз о еды, ка ризы</i> Острая, пульсирующая, самопроизвольная, усиливающаяся ночью или при еде (особенно горячей или холодной). Может отдавать в ухо, висок	Пульпит 81	НЕТ	OOP-85/КО4.0	ОТКРЫТИЕ ПОЛОСТИ БОР МАШИНОЙ, НАЛАДЫВАНИЕ <i>arsen pasta</i> В ПОЛОСТЬ ПОД ДЕНТИН ПАСТОЙ НА 48ч МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ без анестезии безболезненно удаляем некротизированную пульпу. После удаления мертвой пульпы в полость зуба вкладывают тампон с резодент смесью (жидкостью), который в третью посещение заменяют на резодент пасту и сверху накладываем постоянную пломбу (цемион)	НЕТ	для АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБР .ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН , <i>arsen pasta</i> , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , ЦЕМИОН-Ф		НЕТ

4	Абдурасул к Хаётхон	1996	Жен	ГСП№ 1	Манас 29	ЖАЛОБЫ НА УСИЛИН отказ от еды или жевания на одну СТОРОНЮЮ БОЛЬ НОЧЬЮ, отказ от еды или жевания на одну сторону, ощущение «распирания» в зубе, Острая, пульсирующая, самопроизвольная, усиливающаяся ночью или при еде (особенно горячей или холодной). Может отдавать в ухо, висок	ПУЛЬПИТ 16	НЕТ	ООР46/КО4.0	ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ БОР МАШИНОЙ, НАЛАДЫВАНИЕ arsen pasta В ПОЛОСТЬ ПОД ДЕНТИН ПАСТОЙ НА 48ч МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ без анестезии безболезненно удаляем некротизированную пульпу. После удаления мертвой пульпы в полость зуба вкладывают тампон с резодент смесью (жидкостью), который в третье посещение заменяют на резодент пасту и сверху накладываем постоянную пломбу (цемион)	НЕ Т	ДЛЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБР.ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН , arsen pasta , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , ЦЕМИОН-Ф		НЕТ
5	Абдужапар ова Сумая	2014	жен	ГСП№ 1	Салиев а 4 18	болью, жже ием и зудом во ру, отказом от еды из-за болезненных язвочек (афт), отеком и покраснением слизистой, неприятным запахом изо рта, повышением температуры, увеличением лимфоузлов, капризностью, вялостью, сильным слюноотделением или сухостью во рту, а также белым налетом	СТОМАТИТ	НЕТ	K12.1	обработка антисептиками (ХЛОГЕКСИДИН) и протеолитическими ферментами для профилактики вторичного инфицирования; аппликации с анальгетиками; обработка эрозий средствами, которые ускоряют процесс заживления (растворы витаминов, облепиховое масло); физиотерапия – УФО, лазеротерапия . РЕКОМЕНДАЦИЯ НА ДОМ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЛОСТЬ РТА АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ	НЕ Т	ХЛОГЕКСИДИН, GLISTER , БИНТОВЫЕ ТАМПОНЫ , БИОПАСТА		НЕТ

6	Токторова Гуласал	1988	ЖЕН	ГСП№ 1	Аэропорт	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся ночью или от горячего/холодного, которая не проходит после устранения раздражителя; боль иррадиирует (отдает) в висок, ухо, щеку; возникают приступы боли при жевании, может быть отечность десны, неприятный запах изо рта и потемнение зуба; при хроническом пульпите боль может быть тупой, ноющей, а при обострении — резкой.	Пульпит 27	НЕТ	ООР36/КО4.0	МАНДИБ.АНЕСТЕЗИЯ РАСКРЫТИЕ ПОЛОСТИ УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ДОСТУП К КОРНЕВЫМ КАНАЛАМ. УДАЛЕНИЕ ПУЛЬПЫ ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРОМ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА . МАСТЕР ФАЙЛОМ ИЗМЕРЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗАТЕМ РАСШИРИНИЕ КИН-ФАЙЛАМИ И ПРОМЫВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 0,003% БЕЛОДЕЗОМ И ЗАТЕМ ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ АБСОРБЕНТОМ . ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ СИЛЕРОМ И ГУТАПЕРЧОЙ И ЗАКРЫТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБОЙ . 2-ПОСЕЩЕНИЕ ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ	МАНДИБУЛЯРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ	ПУЛЬПОЭКСТРАКТОР , КИН ФАЙЛЫ . ДЛЯ АНТИСЕПТИ ОБР - 0,003% БЕЛОДЕЗ , ХЛОРГЕКСИДИН . ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ СИЛЕР «Гуттасилер» и гуттаперчи 20,25.размеров , дентин паста . ортофосфорная кислота 37% , АДГЕЗИВ , ЖИДКОТЕКУЧИЙ КОМПОЗИТ , ПЛОМБА Charisma		НЕТ
7	Килязова Айбийке	2016	ЖЕН	ГСП№ 1	Баш Булак	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся ночью или от горячего/холодного, которая не проходит после устранения раздражителя; боль иррадиирует (отдает) в висок, ухо, щеку; возникают приступы боли при жевании, может быть отечность десны, неприятный запах изо рта и потемнение зуба; при хроническом пульпите боль может быть тупой, ноющей, а при обострении — резкой	Пульпит 38	НЕТ	ООР36/КО4.0	МАНДИБ.АНЕСТЕЗИЯ РАСКРЫТИЕ ПОЛОСТИ УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ДОСТУП К КОРНЕВЫМ КАНАЛАМ. УДАЛЕНИЕ ПУЛЬПЫ ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРОМ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА . МАСТЕР ФАЙЛОМ ИЗМЕРЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗАТЕМ РАСШИРИНИЕ КИН-ФАЙЛАМИ И ПРОМЫВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 0,003% БЕЛОДЕЗОМ И ЗАТЕМ ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ АБСОРБЕНТОМ . ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ СИЛЕРОМ И ГУТАПЕРЧОЙ И ЗАКРЫТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБОЙ . 2-ПОСЕЩЕНИЕ ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ	МАНДИБУЛЯРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ	ПУЛЬПОЭКСТРАКТОР , КИН ФАЙЛЫ . ДЛЯ АНТИСЕПТИ ОБР - 0,003% БЕЛОДЕЗ , ХЛОРГЕКСИДИН . ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ СИЛЕР «Гуттасилер» и гуттаперчи 20,25.размеров , дентин паста . ортофосфорная кислота 37% , АДГЕЗИВ , ЖИДКОТЕКУЧИЙ КОМПОЗИТ , ПЛОМБА Charisma		НЕТ

8	Байманов Али	2020	МУЖ	ГСП№ 1	Салиев а 24	Жалоб в основном нет, чаще выявляются при осмотре, плановой санации. Но иногда жалобы на наличие свищей, дискомфорт при приёме пищи (застревание пищи с раздражением десневого сосочка), может наблюдаться изменение в цвете зуба. Кариозная полость не глубокая, полость зуба чаще не вскрыта, цвет зуба от сероватого до коричневого, в некоторых случаях интенсивно изменён в цвете в области шейки и прикрыт налётом, что сразу не обнаруживается, на переходной складке м.б. обнаружены свищи, если свищей нет, то переходная складка синюшная, пастозная, парезная.	ПЕРИОДОНТИТ 74	НЕТ	Pt-74/ КО4.4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ – АНТИСЕПТИЧЕКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕТ	для АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБР .ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН ,РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН		НЕТ
9	Салиева Улкан	1957	ЖЕН	ГСП№ 1	Кара Суу район	Жалоб в основном нет, чаще выявляются при осмотре, плановой санации. Но иногда жалобы на наличие свищей, дискомфорт при приёме пищи (застревание пищи с раздражением десневого сосочка), может наблюдаться изменение в цвете зуба. Кариозная полость не глубокая, полость зуба чаще не вскрыта, цвет зуба от сероватого до коричневого, в некоторых случаях интенсивно изменён в цвете в области шейки и прикрыт налётом, что сразу не обнаруживается, на переходной складке м.б. обнаружены свищи, если свищей нет, то переходная складка синюшная, пастозная, парезная.	ПЕРИОДОНТИТ 74	НЕТ	Pt-65/ КО4.4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ – АНТИСЕПТИЧЕКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕТ	для АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБР .ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН ,РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН		НЕТ

1 0	Абдумутам инов Эрулан	2021	МУЖ	ГСП№ 1	Мотор ная 10 9	болью, жжеiem и зудом во рту, отказом от еды из-за болезненных язвочек (афт), отеком и покраснением слизистой, неприятным запахом изо рта, повышением температуры, увеличением лимфоузлов, капризностью, вялостью, сильным слюноотделением или сухостью во рту, а также белым налетом	СТОМАТИТ			обработка антисептиками (ХЛОГЕКСИДИН) и протеолитическими ферментами для профилактики вторичного инфицирования; аппликации с анальгетиками; обработка эрозий средствами, которые ускоряют процесс заживления (растворы витаминов, облепиховое масло); физиотерапия – УФО, лазеротерапия . РЕКОМЕНДАЦИЯ НА ДОМ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЛОСТЬ РТА АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ	НЕ Т	ХЛОГЕКСИД ИН, GLISTER , БИНТОВЫЕ ТАМПОНЫ , БИОПАСТА			НЕ Т
1 1	Адилбеков а Аруузат	2018	ЖЕН	ГСП№ 1	А.Наср иддин ова	острая, но кратковременная боль на сладкое, кислое, горячее или холодное, боль при жевании и попадании пищи в полость зуба	Пульпит 46		C74	ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ С ВОДЯННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ , УДАЛЕНИЕ ВСЕЙ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ЗАТЕМ ПРОТРАВЛЕНИЕ , СУШКА , АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ , ЖИДКОТЕКУЧАЯ ПЛОМБА И ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ ХАРИЗМЫ А2		ПРОТРАВКА 37% ОРТОФОСФОР, БОНД, ФЛО, CHARISMA			НЕ Т

1 2	Камолова Солиха	1994	ЖЕН	ГСП№ 1	Аноши на 84	сильная зубная боль, рис у образ ая или ос оя ая, усиливая аяся о холод о/оряче о, жева ия или адавлива ия, час о бес окоя ая очью, а акже о каз о еды, ка ризы Острая, пульсирующая, самопроизвольная, усиливающаяся ночью или при еде (особенно горячей или холодной). Может отдавать в ухо, висок	Пульпит 84		ООР 84/ КО4. О	ОТКРЫТИЕ ПОЛОСТИ БОР МАШИНОЙ, НАЛАДЫВАНИЕ arsen pasta В ПОЛОСТЬ ПОД ДЕНТИН ПАСТОЙ НА 48ч МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ без анестезии безболезненно удаляем некротизированную пульпу. После удаления мертвой пульпы в полость зуба вкладывают тампон с резодент смесью (жидкостью), который в третье посещение заменяют на резодент пасту и сверху накладываем постоянную пломбу (цемион)	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ - ХЛОРГЕКСИДИН , arsen pasta , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИРА для ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , ЦЕМИОН-Ф			НЕ Т
1 3	Небога Александр	1978	МУЖ	ГСП№ 1	Масал иева 6 64	острая, но кратковременная боль на сладкое, кислое, горячее или холодное, боль при жевании и попадании пищи в полость зуба	КАРИЕС 46		C46	ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ , УДАЛЕНИЕ ВСЕЙ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ЗАТЕМ ПРОТРАВЛЕНИЕ , СУШКА , АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ , ЖИДКОТЕКУЧАЯ ПЛОМБА И ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ ХАРИЗМЫ А2	НЕТ	ПРОТРАВКА 37% ОРТОФОСФОР, БОНД, ФЛО, CHARISMA A2			НЕ Т

1 4	Шайырбек ов Мырза	2012	МУЖ	ГСП№ 1	Раймб екова 17 39	сильная зубная боль, рис у образ ая или ос оя ая, усиливаю аяся о холод о/оряче о, жева ия или адавлива ия, час о бес окоя ая очью, а акже о каз о еды, ка ризы Острая, пульсирующая, самопроизвольная, усиливающаяся ночью или при еде (особенно горячей или холодной). Может отдавать в ухо, висок	ПУЛЬПИТ 46	НЕТ	ООР 85 / КО4. О	ОТКРЫТИЕ ПОЛОСТИ БОР МАШИНОЙ, НАЛАДЫВАНИЕ arsen pasta В ПОЛОСТЬ ПОД ДЕНТИН ПАСТОЙ НА 48ч МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ без анестезии безболезненно удаляют некротизированную пульпу. После удаления мертвой пульпы в полость зуба вкладывают тампон с резодент смесью (жидкостью), который в третье посещение заменяют на резодент пасту и сверху накладываем постоянную пломбу (цемион)	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ - ХЛОРГЕКСИДИН , arsen pasta , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА для ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , ЦЕМИОН-Ф			НЕТ
1 5	Асаналиев а Аделя	2002	ЖЕН	ГСП№ 1	Авицен на 21 96	Жалоб в основном нет, чаще выявляются при осмотре, плановой санации. Но иногда жалобы на наличие свищей, дискомфорт при приёме пищи (застревание пищи с раздражением десневого сосочка), может наблюдаться изменение в цвете зуба. Кариозная полость не глубокая, полость зуба чаще не вскрыта, цвет зуба от сероватого до коричневого, в некоторых случаях интенсивно изменён в цвете в области шейки и прикрыт налётом, что сразу не обнаруживается, на переходной складке м.б. обнаружены свищи, если свищ нет, то переходная складка синюшная, пастозная, парезная.	ПЕРИОДОНТИТ 17	НЕТ	Pt- 51/ КО4. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ - ХЛОРГЕКСИДИН , резодент ВЛАДМИВА для ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН			НЕТ

1 6	Жылкичие ва Акылзат	2000	жен	ГСП№ 1	Бодиги на 2	болью, жжеiem и зудом во р у, отказом от еды из-за болезненных язвочек (афт), отеком и покраснением слизистой, неприятным запахом изо рта, повышением температуры, увеличением лимфоузлов, капризностью, вялостью, сильным слюноотделением или сухостью во рту, а также белым налетом	СТОМАТИТ	НЕТ		обработка антисептиками (ХЛОРГЕКСИДИН)и протеолитическими ферментами для профилактики вторичного инфицирования; аппликации с анальгетиками; обработка эрозий средствами, которые ускоряют процесс заживления (растворы витаминов, облепиховое масло); физиотерапия – УФО, лазеротерапия . РЕКОМЕНДАЦИЯ НА ДОМ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЛОСТЬ РТА АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ	НЕ Т	ХЛОГЕКСИД ИН, GLISTER , БИНТОВЫЕ ТАМПОНЫ , БИОПАСТА			НЕ Т
1 7	Усенова Марьям	2000	ЖЕН	ГСП№ 1	Узгенс кая 134 48	Жалоб в основном нет, чаще выявляются при осмотре, плановой санации. Но иногда жалобы на наличие свищей, дискомфорт при приёме пиши (застревание пиши с раздражением десневого сосочка), может наблюдаться изменение в цвете зула. Кариозная полость не глубокая, полость зула чаще не вскрыта, цвет зула от сероватого до коричневого, в некоторых случаях интенсивно изменён в цвете в области шейки и прикрыт налётом, что сразу не обнаруживается, на переходной складке м.б. обнаружены свищи, если свищей нет, то переходная складка синюшная, пастозная, парезная.	ПЕРИОДОНТИТ	НЕТ	Pt- 75/ КО4. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУСТВИИ ЖАЛОВ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ – ХЛОГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА для ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН			НЕ Т

1 8	Асанбаев Азизулло	2008	муж	ГСП№ 1	Асанч ек 30	острая, но кратковременная боль на сладкое, кислое, горячее или холодное, боль при жевании и попадани холодное, боль при жевании и попадании пищи в полость зуба и пищи в полость зуба	КАРИЕС 85	НЕТ	C85	ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ С ВОДЯННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ , УДАЛЕНИЕ ВСЕЙ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ЗАТЕМ ПРОТРАВЛЕНИЕ , СУШКА , АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ , ЖИДКОТЕКУЧАЯ ПЛОМБА И ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ ХАРИЗМЫ А2	НЕ Т	ПРОТРАВКА 37% ОРТОФОСФОР, БОНД, ФЛО, CHARISMA			НЕТ	
1 9	Кожашев Нурдолот	1987	муж	ГСП№ 1	Мады Айыл	болью, жже ием и зудом во р у, отказом от еды из-за болезненных язвочек (афт), отеком и покраснением слизистой, неприятным запахом изо рта, повышением температуры, увеличением лимфоузлов, капризностью, вялостью, сильным слюноотделением или сухостью во рту, а также белым налетом	СТОМАТИТ	НЕТ	K12. 1	обработка антисептиками (ХЛОРГЕКСИДИН)и протеолитическими ферментами для профилактики вторичного инфицирования; аппликации с анальгетиками; обработка эрозий средствами, которые ускоряют процесс заживления (растворы витаминов, облепиховое масло); физиотерапия – УФО, лазеротерапия . РЕКОМЕНДАЦИЯ НА ДОМ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЛОСТЬ РТА АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ	НЕ Т	ХЛОГЕКСИД ИН, GLISTER , БИНТОВЫЕ ТАМПОНЫ , БИОПАСТА			НЕТ	НЕТ
2 0	Рахимова Мадина	2007	жен	ГСП№ 1	Таджи кская 48	Жалоб в основном нет, чаще выявляются при осмотре, плановой санации. Но иногда жалобы на наличие свищей, дискомфорт при приёме пищи (застревание пищи с раздражением десневого сосочка), может наблюдаться изменение в цвете зуба. Кариозная полость не глубокая, полость зуба чаще не вскрыта, цвет зуба от	ПЕРИ ОДО НТИТ 74	НЕТ	Pt- 74 K04. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ - ХЛОГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА для ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН			НЕТ	

						сероватого до коричневого, в некоторых случаях интенсивно изменён в цвете в области шейки и прикрыт налётом, что сразу не обнаруживается, на переходной складке м.б. обнаружены свищи, если свищей нет, то переходная складка синюшная, пастозная, парезная.				ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОВ – АНТИСЕПТИЧЕКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»					
2 1	Маматаипо ва Арууке	2001	жен	ГСП№ 1	Джим 7 12	Жалоб в основном нет, чаще выявляются при осмотре, плановой санации. Но иногда жалобы на наличие свищей, дискомфорт при приёме пищи (застревание пищи с раздражением десневого сосочка), может наблюдаться изменение в цвете зуба. Кариозная полость не глубокая, полость зуба чаще не вскрыта, цвет зуба от сероватого до коричневого, в некоторых случаях интенсивно изменён в цвете в области шейки и прикрыт налётом, что сразу не обнаруживается, на переходной складке м.б. обнаружены свищи, если свищей нет, то переходная складка синюшная, пастозная, парезная	ПЕРИ ОДО НТИТ 35	НЕТ	Pt- 84 K04. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРотИЗИРОАННОЙ ТКАНИ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕНДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОВ – АНТИСЕПТИЧЕКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА для ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН			Н ЕТ
2 2	КАкбарова	2015	жен	ГСП№ 1	Салиев а 35-39	сильная зубная боль, <i>рис у образ ая или ос оя ая, усиливаю аяся о холод о/o/ оряче о, жева ия или адавлива ия, час о бес окоя ая очью, а акже о каз о еды, ка ризы</i> Острая, пульсирующая, самопроизвольная, усиливающаяся ночью или при еде (особенно горячей или холодной). Может отдавать в ухо, висок	ПУЛЬ ПИТ 54	НЕТ	ООР 54 K04. О	ОТКРЫТИЕ ПОЛОСТИ БОР МАШИНОЙ, НАЛАДЫВАНИЕ <i>arsen pasta</i> В ПОЛОСТЬ ПОД ДЕНТИН ПАСТОЙ НА 48ч МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ без анестезии безболезненно удаляем некротизированную пульпу. После удаления мертвой пульпы в полость зуба вкладывают тампон с резодент смесью (жидкостью), который в	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН , <i>arsen pasta</i> , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА для ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , ЦЕМИОН-Ф			Н ЕТ

2 3	Акбарова Оптахон	2004	Жен	ГСП№ 1	Кош Таш 2	сильная зубная боль, рис у образ ая или ос оя ая, усиливая аяся о холод о о/оряче о, жева ия или адавлива ия, час о бес окоя ая очью, а акже о каз о еды, ка ризы Острая, пульсирующая, самопроизвольная, усиливающаяся ночью или при еде (особенно горячей или холодной). Может отдавать в ухо, висок	Пульпит 46	НЕТ	ООП 85\\ КО4. О	ОТКРЫТИЕ ПОЛОСТИ БОР МАШИНОЙ, НАЛАДЫВАНИЕ <i>arsen pasta</i> В ПОЛОСТЬ ПОД ДЕНТИН ПАСТОЙ НА 48ч МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ без анестезии безболезненно удаляем некротизированную пульпу. После удаления мертвой пульпы в полость зуба вкладывают тампон с резодент смесью (кидкостью), который в третье посещение заменяется на резодент пасту и сверху накладываем постоянную пломбу (цемион)	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ - ХЛОРГЕКСИДИН , <i>arsen pasta</i> , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , ЦЕМИОН-Ф				НЕ Т
2 4	Жакыпова Сабина	1995	жен	ГСП№ 1	Карасу йская 36 12	острая, но кратковременная боль на сладкое, кислое, горячее или холодное, боль при жевании и попадани холодное, боль при жевании и попадании пищи в полость зуба и пищи в полость зуба	стоматит	НЕТ	C75	ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ С ВОДЯННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ , УДАЛЕНИЕ ВСЕЙ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ЗАТЕМ ПРОТРАВЛЕНИЕ , СУШКА , АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ , ЖИДКОТЕКУЧАЯ ПЛОМБА И ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ ХАРИЗМЫ А2	НЕ Т	ПРОТРАВКА 37% ОРТОФОСФОР, БОНД, ФЛО, CHARISMA			НЕ Т	
2 5	Мажитова Айжамал	2006	жен	ГСП№ 1	Джим 2 16	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу,	ПЕРИ ОДО НТИТ 54	НЕТ	Pt85	НАПРАВЛЕН В ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ДРЕНАЖА \ ЛИБО УДАЛЕНИЕ		-			НЕ Т	

2 6	Мурзалиев Эрбол	2017	M	ГСП№ 1	Косчиб еков 5 34	увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гнойным, появляется <i>ри ух ая, крас ая дес а с возмож ым образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации.	СТОМАТИТ	НЕТ		обработка антисептиками (ХЛОРГЕКСИДИН) и протеолитическими ферментами для профилактики вторичного инфицирования; аппликации с анальгетиками; обработка эрозий средствами, которые ускоряют процесс заживления (растворы витаминов, облепиховое масло); физиотерапия – УФО, лазеротерапия . РЕКОМЕНДАЦИЯ НА ДОМ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЛОСТЬ РТА АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ	НЕ Т	ХЛОГЕКСИД ИН, GLISTER, БИНТОВЫЕ ТАМПОНЫ , БИОПАСТА				НЕ Т
2 7	Жаныбаев Баязет	2003	M	ГСП№ 1	Джим 27-7	Жалоб в основном нет, чаще выявляются при осмотре, плановой санации. Но иногда жалобы на наличие свищей, дискомфорт при приёме пищи (застревание пищи с раздражением десневого сосочка), может наблюдаться изменение в цвете зуба. Кариозная полость не глубокая, полость зуба чаще не вскрыта, цвет зуба от сероватого до коричневого, в некоторых случаях интенсивно изменён в цвете в области шейки и прикрыт налётом, что сразу же обнаруживается, на	ПЕРИ ОДО НТИТ 26	НЕТ	Pt- 26 K04. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН 0,003% БЕЛОДЕЗ),РЕОМЕНДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙЮ .2- ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛОСТЬ ЧИСТА , АНИТЕП.ОБР. ВУ=	НЕ Т				НЕ Т	

2 8	Маматбуба ева Муаззам	2004	M	ГСП№ 1	Мады айыл	переходной складке м.б. обнаружены свищи, если свищей нет, то переходная складка синюшная, пастозная, парезная									

2 9	Холбабаев а Оминахон	2002	ж	ГСП№ 1	Ошска я 156	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гнойным, появляется <i>ри ух ая, крас ая дес а с возмож ым образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации.	ПЕРИОДОНТИТ 34	НЕТ	Pt-85 КО4.4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОВ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕ Т	ДЛЯ АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР .ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИРА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН		НЕТ
3 0	Сабиров Кабул	1959	м	ГСП№ 1	Матрос ова 14	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся ночью или от горячего/холодного, которая не проходит после устранения раздражителя; боль иррадиирует (отдает) в висок, ухо, щеку; возникают приступы боли при жевании, может быть отечность десны, неприятный запах изо рта и потемнение зуба; при хроническом пульпите боль может быть тупой, ноющей, а при обострении — резкой.	ПКЛЫПЛИТ 36	НЕТ	OOP36\КО4.0	МАНДИБ.АНЕСТЕЗИЯ РАСКРЫТИЕ ПОЛОСТИ УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ДОСТУП К КОРНЕВЫМ КАНАЛАМ. УДАЛЕНИЕ ПУЛЬПЫ ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРОМ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА . МАСТЕР ФАЙЛОМ ИЗМЕРЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗАТЕМ РАСШИРАНИЕ К и Н-ФАЙЛАМИ И ПРОМЫВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 0,003% БЕЛОДЕЗОМ И ЗАТЕМ ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ АБСОРБЕНТОМ . ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ СИЛЕРОМ И ГУТАПЕРЧОЙ И ЗАКРЫТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ	МАНДИБУЛЯРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ	ПУЛЬПОЭКСТРА КТОР , К и Н ФАЙЛЫ . ДЛЯ АНТИСЕПТОБР - 0,003% БЕЛОДЕЗ , ХЛОРГЕКСИДИН . ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ СИЛЕР «Гуттасилер» и гуттаперчи 20,25.размеров , дентин паста . ортодосфорная кислота 37% , адгезив , жидкотекущий композит , пломба Charisma		НЕТ

3 1	Жаныбаев Баязет	2007	м	ГСП№ 1	Джим 27-7	болью, <i>жже</i> <i>и</i> <i>ем</i> и <i>зудом</i> <i>во</i> <i>р</i> <i>у</i> , отказом от еды из-за болезненных язвочек (афт), отеком и покраснением слизистой, неприятным запахом изо рта, повышением температуры, увеличением лимфоузлов, капризностью, вялостью, сильным слюноотделением или сухостью во рту, а также белым налетом	СТОМАТИТ	НЕТ	обработка антисептиками (ХЛОРГЕКСИДИН) и протеолитическими ферментами для профилактики вторичного инфицирования; аппликации с анальгетиками; обработка эрозий средствами, которые ускоряют процесс заживления (растворы витаминов, облепиховое масло); физиотерапия – УФО, лазеротерапия . РЕКОМЕНДАЦИЯ НА ДОМ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЛОСТЬ РТА АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ	НЕ Т	ХЛОГЕКСИД ИН, GLISTER , БИНТОВЫЕ ТАМПОНЫ , БИОПАСТА			НЕ Т
3 2	Низомидди нова София	2020	ж	ГСП№ 1	Узгенс кая 30	острая, но кратковременная боль на сладкое, кислое, горячее или холодное, боль при жевании и попадани холодное, боль при жевании и попадании пищи в полость зуба и пищи в полость зуба	Пульп ид36	НЕТ	ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ С ВОДЯННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ , УДАЛЕНИЕ ВСЕЙ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ЗАТЕМ ПРОТРАВЛЕНИЕ , СУШКА , АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ , ЖИДКОТЕКУЧАЯ ПЛОМБА И ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ ХАРИЗМЫ А2	НЕ Т	ПРОТРАВКА 37% ОРТОФОСФОР , БОНД, ФЛО, CHARISMA			НЕ Т

3 3	Якубжанов а Захро	2020	*	ГСП№ 1	Амир Темур1 2	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гнойным, появляется <i>ри ух ая,</i> <i>крас ая дес а с возмож ым</i> <i>образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации.	ПЕРИОДОНТИ65	НЕТ	Pt55 \KO4.4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОВ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕ Т	ДЛЯ АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР .ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН		
3 4	Вахапова Бегимай	2008	*	ГСП№ 1	Салиев а 15-21	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гнойным, появляется <i>ри ух ая,</i> <i>крас ая дес а с возмож ым</i> <i>образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации.	ПЕРИОДОНТИ75	НЕТ	Pt55 \KO4.4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОВ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕ Т	ДЛЯ АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР .ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН		

3 5	Собиржан ов Азирет	1999	М	ГСП№ 1	Жийде лик 44	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся ночью или от горячего/холодного, которая не проходит после устранения раздражителя; боль иррадиирует (отдает) в висок, ухо, щеку; возникают приступы боли при жевании, может быть отечность десны, неприятный запах изо рта и потемнение зуба; при хроническом пульгите боль может быть тупой, ноющей, а при обострении — резкой	Пульгит75	НЕТ	ООР46\КО4.0	МАНДИБ.АНЕСТЕЗИЯ РАСКРЫТИЕ ПОЛОСТИ УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ, ДОСТУП К КОРНЕВЫМ КАНАЛАМ. УДАЛЕНИЕ ПУЛЬПЫ ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРОМ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. МАСТЕР ФАЙЛОМ ИЗМЕРЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗАТЕМ РАСШИРАНИЕ К и Н- ФАЙЛАМИ И ПРОМЫВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 0,003% БЕЛОДЕЗОМ И ЗАТЕМ ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ АБСОРБЕНТОМ. ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ СИЛЕРОМ И ГУТАПЕРЧОЙ И ЗАКРЫТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБОЙ. 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ	МАНДИБУЛЯРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ	ПУЛЬПОЭКСТРА КТОР , К и Н ФАЙЛЫ . ДЛЯ АНТИСЕПТ ОБР - 0,003% БЕЛОДЕЗ , ХЛОРГЕКСИДИН . ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ СИЛЕР «Гуттасилер» и гуттаперчи 20,25.размеров , дентин паста . ортодонтическая кислота 37% , адгезив , жидкотекущий композит , пломба Charisma		
3 6	Кадырова Аяна	2012	Ж	ГСП№ 1	Ленин бок 21	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гнойным, появляется <i>ри ух ая,</i> <i>крас ая дес а с возмож ым</i> <i>образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации	ГНОЙ НЫЙ ПЕРИ ОДО НТИТ	НЕТ		НАПРАВЛЕН В ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 36 ЗУБА	НЕ Т			
3 7	Кошмамат ова Рахима	2012	Ж	ГСП№ 1	Авицен на 20- 98	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность	ПЕРИ ОДО НТИТ 51	НЕТ	Pt51 \\ КО4. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ	НЕ Т	ДЛЯ АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ - ХЛОРГЕКСИДИН		Н ЕТ

						зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гноинм, появляется <i>ри ух ая,</i> <i>крас ая дес а с возмож ым</i> <i>образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации				КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОВ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»		, РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН		
3 8	Нуромото ва Элина	2021	Ж	ГСП№ 1	Исанов а 51-31	болью, жже ием и зудом во р у, отказом от еды из-за болезненных язвочек (афт), отеком и покраснением слизистой, неприятным запахом изо рта, повышением температуры, увеличением лимфоузлов, капризностью, вялостью, сильным слюноотделением или сухостью во рту, а также белым налетом	СТОМ АТИТ	НЕТ		обработка антисептиками (ХЛОРГЕКСИДИН)и протеолитическими ферментами для профилактики вторичного инфицирования; аппликации с анальгетиками; обработка эрозий средствами, которые ускоряют процесс заживления (растворы витаминов, облепиховое масло); физиотерапия – УФО, лазеротерапия . РЕКОМЕНДАЦИЯ НА ДОМ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЛОСТЬ РТА АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ	НЕ Т	ХЛОГЕКСИД ИН, GLISTER, БИНТОВЫЕ ТАМПОНЫ , БИОПАСТА		Н ЕТ
3 9	Урустамов а Раяна	2017	Ж	ГСП№ 1	Масал иева 101-60	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах	ПУЛЬ ПИТ4 8	НЕТ	ООР 55\\ КО4. О	ОТКРЫТИЕ ПОЛОСТИ БОР МАШИНОЙ, НАЛАДЫВАНИЕ arsen pasta в ПОЛОСТЬ ПОД ДЕНТИН ПАСТОЙ НА 48ч МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ без анестезии безболезненно удаляем некротизированную пульпу. После удаления мертвой пульпы в полость зуба	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР .ПОЛОСТИ – ХЛОГЕКСИДИН , arsen pasta, РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ ,		НТ

						изо рта. процесс становится гноинм, появляется <i>ри ух ая, крас ая дес а с возмож ым образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации.				вкладывают тампон с резодент смесью (жидкостью), который в третье посещение заменяют на резодент пасту и сверху накладываем постоянную пломбу (цемион)		ЦЕМИОН-Ф			
4 0	Мажитова Айжамал	206	Ж	ГСП№ 1	Ждими 2 -16	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гноинм, появляется <i>ри ух ая, крас ая дес а с возмож ым образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации	ПУЛЬ ПИТ7 5	НЕТ	ООР 55\\ КО4. О	ОТКРЫТИЕ ПОЛОСТИ БОР МАШИНОЙ, НАЛАДЫВАНИЕ arsen pasta В ПОЛОСТЬ ПОД ДЕНТИН ПАСТОЙ НА 48ч МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ без анестезии безболезненно удаляем некротизированную пульпу. После удаления мертвой пульпы в полость зуба вкладывают тампон с резодент смесью (жидкостью), который в третье посещение заменяют на резодент пасту и сверху накладываем постоянную пломбу (цемион)	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР .ПОЛОСТИ - ХЛОРГЕКСИДИН , arsen pasta, РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , ЦЕМИОН-Ф			Н ЕТ
4 1	Ираимова Венера	1985	Ж	ГСП№ 1	Салиев а 21-40	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гноинм, появляется <i>ри ух ая, крас ая дес а с возмож ым образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации.	ПЕРИ ОДО НТИТ 74	НЕТ	Pt46 \\ КО4. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕНДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 0,003 БЕЛОДЕЗ , ХЛОРГЕКСИДИН			Н ЕТ
4 2	Носирова Рузихон	2009	Ж	ГСП№ 1	Турсун баева	болью, жже ием и зудом во ру, отказом от еды из-за болезненных язвочек (афт),	ЯЗВН НЫЙ	НЕТ		Лечение язвенного стоматита комплексное и включает антисептическую	НЕ Т	ХЛОГЕКСИД ИН,			Н ЕТ

					160	отеком и покраснением слизистой, неприятным запахом изо рта, повышением температуры, увеличением лимфоузлов, капризностью, вялостью, сильным слюноотделением или сухостью во рту, а также белым налетом	СТОМ АИТ			обработку рта (хлоргексидин, перекись), обезболивание (гели с анестетиком), заживляющие средства (мази с метронидазолом, облепиховое масло, солкосерил), санацию полости рта (лечение зубов, снятие налета), диету с исключением раздражающей пищи, а при тяжелых формах — системные препараты (антибиотики, поливитамины)		GLISTER, БИНТОВЫЕ ТАМПОНЫ , БИОПАСТА			
4 3	Аскаров Ади	2004	м	ГСП№ 1	Карасу йская 36-10	САНА ИЯ ОЛОС ИРА		НЕТ		КОНСУЛЬТАЦИЯ , ОБУЧЕНИЕ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА И РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕТ ЗУБНЫХ ПАСТ А ТАКЖЕ ЗУБНЫХ ЩЕТОК					
4 4	Атаканова Санобар	1964	Ж	ГСП№ 1	Салиев а 20-1	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гнойным, появляется <i>ри ух ая, крас ая дес а с возмож ым образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации	ПУЛЬ ПИТ 36	НЕТ	ООР 84 \\ КО4. О	ОТКРЫТИЕ ПОЛОСТИ БОР МАШИНОЙ, НАЛАДЫВАНИЕ arsen pasta в ПОЛОСТЬ ПОД ДЕНТИН ПАСТОЙ НА 48ч МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ без анестезии безболезненно удаляем некротизированную пульпу. После удаления мертвой пульпы в полость зуба вкладывают тампон с резодент смесью (жидкостью), который в третье посещение заменяют на резодент пасту и сверху накладываем постоянную пломбу (цемион)	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР .ПОЛОСТИ - ХЛОРГЕКСИДИН , arsen pasta , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , ЦЕМИОН-Ф			Н ЕТ
4 5	Эгамберди ева Муслима	1988	Ж	ГСП№ 1	Шарк айыл	острая, но кратковременная боль на сладкое, кислое, горячее или холодное, боль при жевании и попадани	КАРИ ЕС 17	НЕТ	С85	ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ С ВОДЯННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ , УДАЛЕНИЕ ВСЕЙ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ЗАТЕМ ПРОТРАВЛЕНИЕ , СУШКА ,	НЕ Т	ПРОТРАВКА 37% ОРТОФОСФОР, БОНД, ФЛО, CHARISMA			Н ЕТ

						холодное, боль при жевании и попадании пищи в полость зуба и пищи в полость зуба				АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ , ЖИДКОТЕКУЧАЯ ПЛОМБА И ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ ХАРИЗМЫ А2						
4 6	Абулазиз ов Имран	1997	М	ГСП№ 1	М. Калени н 134	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гноинм, появляется <i>ри ух ая, крас ая дес а с возмож ым образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации	ПЕРИ ОДО НТИТ 65	НЕТ	Pt85 \\ КО4. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР .ПОЛОСТИ - ХЛОРГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА для ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН				Н ЕТ
4 7	Хусанова Фотима	2020	Ж	ГСП№ 1	Аэропо рт 6-31	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гноинм, появляется <i>ри ух ая, крас ая дес а с возмож ым образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации	ПЕРИ ОДО НТИТ 85	НЕТ	Pt61 \\ КО4. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР .ПОЛОСТИ - ХЛОРГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА для ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН				Н ЕТ

4 8	Мараимов Алибек	2022	м	ГСП№ 1	Касын бекова 17	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гнойным, появляется <i>ри ух ая,</i> <i>крас ая дес а с возмож ым</i> <i>образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации	ПЕРИ ОДОНТ ИТ65	НЕТ		ПАСТОЙ», и ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»						НЕ Т
4 9	Колдошба ев Мирлан	1998	ж	ГСП№ 2	Салие ва 6-1	болью, <i>жже ием и зудом во</i> <i>р у, отказом от еды из-за</i> болезненных язвочек (афт), отеком и покраснением слизистой, неприятным запахом изо рта, повышением температуры, увеличением лимфоузлов, капризностью, вялостью, сильным слюноотделением или сухостью во рту, а также белым налетом	СТОМ АТИТ	НЕТ		Лечение язвенного стоматита комплексное и включает антисептическую обработку рта (хлоргексидин, перекись), обезболивание (гели с анестетиком), заживающие средства (мази с метронидазолом, облепиховое масло, сolkosерил), санацию полости рта (лечение зубов, снятие налета), диету с исключением раздражающей пищи, а при тяжелых формах — системные препараты (антибиотики, поливитамины)		НЕ Т	ХЛОГЕКСИД ИН, GLISTER, БИНТОВЫЕ ТАМПОНЫ , БИОПАСТА			НЕ
5 0	Критенко Юлия	1993	ж	ГСП№ 1	Узгенс кая 8	сильная зубная боль, <i>рис у ообраз ая или</i> <i>ос оя ая, усиливаю аяся</i> <i>о холод о/оряче о,</i> <i>жева ия или адавлива ия,</i> <i>час о бес окоя ая очью, а</i> <i>акже о каз о еды, ка ризы</i>	ПУЛЬ ПИТ 74	НЕТ	ООР 74 \\ КО4. О	ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ БОР МАШИНОЙ, НАЛАДЫВАНИЕ <i>arsen pasta</i> В ПОЛОСТЬ ПОД ДЕНТИН ПАСТОЙ НА 48 Ч МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ без анестезии безболезненно		НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ — ХЛОГЕКСИДИН , <i>arsen pasta</i> , РЕЗОДЕНТ			НЕ

5 1	Хабиулла ева Имона	2000	ж	ГСП№ 1	Ашима хунова 42-9	ЖАЛОБЫ НА УСИЛИН отказ от еды или жевания на одну СТОРОНЮЮ БОЛЬ НОЧЬЮ, отказ от еды или жевания на одну сторону, ощущение «распирания» в зубе, Острая, пульсирующая, самопроизвольная, усиливающаяся ночью или при еде (особенно горячей или холодной). Может отдавать в ухо, висок	ПУЛЬ ПИТ 48	НЕТ	ООР 46 КО4. О	удаляем некротизированную пульпу. После удаления мертвой пульпы в полость зуба вкладывают тампон с резодент смесью (жидкостью), который в третье посещение заменяется на резодент пасту и сверху накладываем постоянную пломбу (цемион)	ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , ЦЕМИОН-Ф				
5 2	Юсупова Хафиза	2003	Ж	ГСП№ 1	Джим 43			НЕТ		МАНДИБ.АНЕСТЕЗИЯ РАСКРЫТИЕ ПОЛОСТИ УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ДОСТУП К КОРНЕВЫМ КАНАЛАМ. УДАЛЕНИЕ ПУЛЬПЫ ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРОМ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА . МАСТЕР ФАЙЛОМ ИЗМЕРЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗАТЕМ РАСШИРАНИЕ К и Н- ФАЙЛАМИ И ПРОМЫВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 0,003% БЕЛОДЕЗОМ И ЗАТЕМ ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ АБСОРБЕНТОМ . ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ СИЛЕРОМ И ГУТАПЕРЧОЙ И ЗАКРЫТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ	МАНДИБУЛЯРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПУЛЬПОЭКСТРА КТОР , К и Н ФАЙЛЫ . ДЛЯ АНТИСЕПТИ ОБР - 0,003% БЕЛОДЕЗ , ХЛОРГЕКСИДИН . ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ СИЛЕР «Гуттасилер» и гуттаперчи 20,25.размеров , дентин паста . ортодосфорная кислота 37% , адгезив , жидкотекущий композит , пломба Charisma				
5 3	Тиллабаев Фирдавс	2017	М	ГСП№ 1	Гагрин Зеленна я	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу,	ПЕРИ ОДО НТИТ 74	НЕТ	Pt 61 \\ КО4. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ - ХЛОРГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ				

						увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гнойным, появляется <i>ри ух ая, крас ая дес а с возмож ым образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации.				ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»		КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН		
5 4	Матисанов а Ыквал	1959	Ж	ГСП№ 1	Калму рзаева 34	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гнойным, появляется <i>ри ух ая, крас ая дес а с возмож ым образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации.	ПЕРИ ОДО НТИТ 74	НЕТ	Pt 61 \\ КО4. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕ Т	ДЛЯ АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР .ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН		НЕ Т
5 5	Бурконова Мерина	2018	Ж	ГСП№ 1	А.Шак ирова 11	болью, <i>жже ием и зудом во ру</i> , отказом от еды из-за болезненных язвочек (афт), отеком и покраснением слизистой, неприятным запахом изо рта, повышением температуры, увеличением лимфоузлов, капризностью, вялостью, сильным слюноотделением или сухостью во рту, а также белым налетом	СТОМ АТИТ	НЕТ		обработка антисептиками (ХЛОРГЕКСИДИН)и протеолитическими ферментами для профилактики вторичного инфицирования; аппликации с анальгетиками; обработка эрозий средствами, которые ускоряют процесс заживления (растворы витаминов, облепиховое	НЕ Т	ХЛОГЕКСИД ИН, GLISTER , БИНТОВЫЕ ТАМПОНЫ , БИОПАСТА		НЕ Т

5 6	Майрамбек ов Али	1995	М	ГСП№ 1	Ошска я 10 - 45	САНА ИЯ ОЛОС ИРА	КОНС УЛЬТ АЦИЯ	НЕТ		КОНСУЛЬТАЦИЯ	НЕ Т								Н ЕТ	
5 7	Махмуджа нов Муртаза	1997	М	ГСП№ 1	Ошска я 6	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гнойным, появляется <i>ри ух ая,</i> <i>крас ая дес а с возмож ым</i> <i>образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации.	ПЕРИ ОДО НТИТ 64	НЕТ	Pt 81 \\ KO4. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОВ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕ Т	для АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР.ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА для ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН								

5 8	Жусупов Умарбек	1998	M	ГСП№ 1	Раймб екова 17	ЖАЛОБЫ НА УСИЛИН отказ от еды или жевания на одну СТОРОНЮЮ БОЛЬ НОЧЬЮ, отказ от еды или жевания на одну сторону, ощущение «распирания» в зубе, Острая, пульсирующая, самопроизвольная, усиливающаяся ночью или при еде (особенно горячей или холодной). Может отдавать в ухо, висок	ПУЛЬ ПИТ2 6	НЕТ	ООР 36 \\ КО4. О	МАНДИБ.АНЕСТЕЗИЯ РАСКРЫТИЕ ПОЛОСТИ УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ДОСТУП К КОРНЕВЫМ КАНАЛАМ. УДАЛЕНИЕ ПУЛЬПЫ ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРОМ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА . МАСТЕР ФАЙЛОМ ИЗМЕРЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗАТЕМ РАСШИРАНИЕ К и Н- ФАЙЛАМИ И ПРОМЫВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 0,003% БЕЛОДЕЗОМ И ЗАТЕМ ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ АБСОРБЕНТОМ . ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ СИЛЕРОМ И ГУТАПЕРЧОЙ И ЗАКРЫТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ	МАНДИБУЛЯРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ	ПУЛЬПОЭКСТРА КТОР , К и Н ФАЙЛЫ . ДЛЯ АНТИСЕПТИ ОБР - 0,003% БЕЛОДЕЗ , ХЛОРГЕКСИДИН . ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ СИЛЕР «Гуттасилер» и гуттаперчи 20,25.размеров , дентин паста . ортодонтическая кислота 37% , адгезив , жидкотекущий композит , пломба Charisma		
5 9	Маматов Аззам	2004	M	ГСП№ 1	Поноф илюв 19	ЖАЛОБЫ НА УСИЛИН отказ от еды или жевания на одну СТОРОНЮЮ БОЛЬ НОЧЬЮ, отказ от еды или жевания на одну сторону, ощущение «распирания» в зубе, Острая, пульсирующая, самопроизвольная, усиливающаяся ночью или при еде (особенно горячей или холодной). Может отдавать в ухо, висок	ПУЛЬ ПИТ 54	НЕТ	ООР 36 \\ КО4. О	МАНДИБ.АНЕСТЕЗИЯ РАСКРЫТИЕ ПОЛОСТИ УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ , ДОСТУП К КОРНЕВЫМ КАНАЛАМ. УДАЛЕНИЕ ПУЛЬПЫ ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРОМ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА . МАСТЕР ФАЙЛОМ ИЗМЕРЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗАТЕМ РАСШИРАНИЕ К и Н- ФАЙЛАМИ И ПРОМЫВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 0,003% БЕЛОДЕЗОМ И ЗАТЕМ ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ АБСОРБЕНТОМ . ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ СИЛЕРОМ И ГУТАПЕРЧОЙ И ЗАКРЫТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ	МАНДИБУЛЯРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ	ПУЛЬПОЭКСТРА КТОР , К и Н ФАЙЛЫ . ДЛЯ АНТИСЕПТИ ОБР - 0,003% БЕЛОДЕЗ , ХЛОРГЕКСИДИН . ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ СИЛЕР «Гуттасилер» и гуттаперчи 20,25.размеров , дентин паста . ортодонтическая кислота 37% , адгезив , жидкотекущий композит , пломба Charisma		

6 0	Рустамжан ова Омина	2022	Ж	ГСП№ 1	Жийде лик 75	сильную, пульсирующую боль, усиливающуюся при накусывании, ощущение, что зуб «вырос» и мешает, покраснение и отек десны, иногда щеки, подвижность зуба, повышение температуры, общую слабость, бессонницу, увеличение лимфоузлов под челюстью, неприятный запах изо рта. процесс становится гнойным, появляется <i>ри ух ая,</i> <i>крас ая дес а с возмож ым</i> <i>образова ием сви а (fistula)</i> с гноем и более яркие признаки интоксикации.	ПЕРИ ОДО НТИТ 85	НЕТ	Pt 84 \\ КО4. 4	ВСКРЫТИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ БОРОМ, УДАЛЕНИЕ НЕКРАТИЗИРОАННОЙ ТКАНИ,АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ХЛОРГЕКСИДИН),РЕОМЕН ДАЦИИ НА ДОМ ПРОМЫВАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ И ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛОСТЬ ВАТОЙ . 2- ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОВ – АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБР. ВЫСУШИВАНИЕ КАНАЛОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ «РЕЗОДЕНТ ПАСТОЙ» , И ПОСТАНОВКА ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ «БЕЛАЦИН»	НЕ Т	ДЛЯ АНТИСЕПТИЧЕС КОЙ ОБР .ПОЛОСТИ – ХЛОРГЕКСИДИН , РЕЗОДЕНТ ВЛАДМИВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ , БЕЛАЦИН			
--------	------------------------	------	---	-----------	-----------------	---	---------------------------	-----	-----------------------------	--	---------	---	--	--	--