

Бумажный плод

КАК ОСЛОЖНЕНИЕ МНОГОПЛОДНОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ.



Многоплодной называют
беременность, при
которой в организме
женщины развивается
два плода или более.



Статистика :

- В Кыргызстане встречаемость многоплодных беременностей оценивается примерно в 0,7 – 1,5 % от всех беременностей.
- Это означает примерно 7–15 случаев на 1000 беременностей.
- Такая частота сопоставима с международными показателями для естественных (спонтанных) беременностей, которые в литературе часто указывают в диапазоне 1 – 2 %



Основные факторы, влияющие на частоту многоплодных беременностей:

- Возраст матери старше 30–35 лет, или младше 18 лет
- Наследственность по материнской линии
- высокий паритет (многорожавшие),
- аномалии развития матки (удвоение),
- Использование вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)
- Стимуляция овуляции— эти факторы повышают вероятность многоплодия.

Проблемы многоплодной беременности

- Значительное число осложнений во время беременности
- Повышенный уровень антенатальных потерь в различные гестационные сроки
- Проблемы здоровья близнецов
- Осложнения послеродового периода

Осложнения беременности

- Фетоплацентарная недостаточность
- Фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС)
- Антенатальная гибель плодов
- Неврологические осложнения

Внутриутробная гибель плода по триместрам

І триместр беременности

- Синдром исчезающего близнеца
- Гибель одного эмбриона до 12–14 недель
- Эмбрион резорбируется
- Часто протекает бессимптомно
- Обычно не влияет на исход беременности для второго плода

ІІ триместр беременности

- «Бумажный плод»
- Возможные исходы:
 - Fetus papyraceus (мумификация плода)
 - Компрессия погибшего плода живым
 - Повышенный риск осложнений у выжившего плода
 - (ЗВУР, неврологические